

Santiago, 30 de marzo de 2017

SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO



At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Sr. Marcos Muñoz Fuenzalida, Jefe Subdepartamento Sanidad Vegetal.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida **RAYO 50 EC**, (Permetrina 50 % p/v, formulación Concentrado Emulsionable), número de autorización SAG 1339, para el control de *Bagrada hilaris* (Burmeister), en cultivos de Brasicáceas y otras especies hospedantes en Chile.

ANASAC Chile S.A. certifica que es posible recomendar el uso del insecticida RAYO 50 EC, número de autorización SAG 1339, para el control de *Bagrada hilaris*, el cual es efectivo en cultivos de Brasicáceas y otras especies hospedantes.


RAYO 50 EC para el control de *Bagrada hilaris* puede ser aplicado 4 veces durante la temporada. Se aplica mediante aspersion dirigida a los plantas, de acuerdo a monitoreo y presencia de la plaga. Actúa por contacto, ingestión y repelencia.

La dosis de RAYO 50 EC para el control de *Bagrada hilaris*, período de protección y carencias se describen a continuación:

Cultivo	Dosis	Período de protección por aplicación (días)	Período de Carencia (días) (considerando Resolución Exenta N° 33, MINSAL)
Repollo, coliflor, brócoli, rúcula, rabanito, kale, pak-choi	150 a 200 ml/ha	5	3

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de RAYO 50 EC: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora, no aplicar con temperaturas mayores a 30 °C, no aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes. Utilizar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones medias a altas.

El tiempo de reingreso es de 12 horas.



Ing. Agr. Francisco Sánchez Taky
Jefe Departamento Técnico y Desarrollo
División Fitosanidad – ANASAC Chile S.A.