

FUNGICIDA
GOLDEN SC
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.729

GOLDEN SC, es un fungicida recomendado para el control de los hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

* Tebuconazol	36 % p/v (360 g/l)
** Kresoxim-metilo	8 % p/v (80 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1 l)
* (RS)-1- <i>p</i> -clorofenil-4,4-dimetil-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol	
** (E)-metoxiimino[α -(<i>o</i> -toliloxi)- <i>o</i> -tolil]acetato de metilo	

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300, Providencia
SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)

Melchor Romero, La Plata, Provincia de Buenos Aires - Argentina

HUALONG CHEMICAL INDUSTRY Co. Ltd.

Oficina: 17° Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004, China.

Fábrica: Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co. Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China ZIP: 324400

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GOLDEN SC, fungicida, compuesto por Tebuconazol perteneciente al grupo químico de los triazoles y Kresoxim-metilo perteneciente al grupo químico de los oximinacetatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la suspensión concentrada usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

GOLDEN SC, es muy tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos, moderadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones de triple lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos tres veces hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado, perforar los envases para así evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar al afectado al hospital más cercano. Si es posible llevar la etiqueta o el envase del producto. **Síntomas:** irritación gastrointestinal con diarrea

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DETINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **GOLDEN SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave exclusivo para productos fitosanitarios. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO:

Golden SC, es un fungicida sistémico y de contacto recomendado para el control de botrytis y oidio en vides.

Cuadro de instrucciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
VIDES	Botrytis Oidio	65-90 cc/hl Mínimo 1 L/ha	Aplicar en floración (entre inicio de flor y plena flor), para control simultaneo de Botrytis y Oidio. Se puede repetir la aplicación en caso de ser necesario, con un intervalo de 14 días entre una aplicación y otra. Aplicar entre Pinta y Cosecha para control de Botrytis. Se recomienda lograr un buen cubrimiento en la aplicación. En caso de aplicaciones de bajo volumen aplicar un mínimo de 1 Lt/ha. Volumen de agua sugerido: 1.100 a 1.500 L/ha	12

Instrucciones de uso:

Realizar no más de 3 aplicaciones por temporada, dentro de un programa de control de enfermedades, en los momentos señalados. En el caso de realizar aplicaciones seguidas utilizar un intervalo mínimo de aproximadamente 14 días.

Precaución para ABEJAS:

GOLDEN SC está clasificado como virtualmente no tóxico para abejas, sin embargo se recomienda que las aplicaciones a cultivos que estén en período de floración se realicen al atardecer, en la noche o temprano en la mañana, cuando no haya actividad de las abejas.

En la floración de las vides no hay participación de abejas ni de otros insectos polinizadores.

Preparación de la mezcla:

Medir la dosis requerida de **Golden SC** y luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento, para mantener una emulsión homogénea.

Incompatibilidad:

Evitar mezclas con insecticidas piretroides en formulación Concentrado Emulsionable.

En caso de duda respecto de la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

Fitotoxicidad:

No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Reingreso al área tratada:

Para personas esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

No corresponde un tiempo de reingreso para animales ya que el cultivo no tiene como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

