

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: 3 TAEX es un fungicida biológico en base a conidias, clamidosporas, micelios y fragmentos hifales de la Cepa T-26 del hongo *Trichoderma viride*, la Cepa T-22 del hongo *Trichoderma harzianum* y la Cepa T-397 del hongo *Trichoderma longibrachiatum*.

- **3 TAEX** (Triple trichoderma activado en látex). Biofungicida, presenta como ingrediente activo una mezcla activa de 3 especies de Trichodermas.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Durante la aplicación del producto utilizar equipo de protección personal: guantes impermeables, protector facial, botas de goma y overol impermeable.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa, durante el manejo.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas durante la aplicación.
- No aplique directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, después del trabajo.
- Una vez vacío los envases, se debe realizar el triple lavado de los envases, y asperjar la solución de la mezcla resultante del triple lavado sobre los troncos de los árboles.

Síntomas de intoxicación: no se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

-Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos Si persiste irritación, consultar a un médico.

-Contacto con la piel: Lavar la zona de la piel afectada con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Consultar al médico.

-Inhalación: Reposo, respirar aire fresco. Si se desarrollan síntomas, consultar a un médico.

-Ingestión: Beber agua e inducir vómitos si el paciente está consciente. No suministrar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: 3 TAEX no contiene metales pesados; no presenta riesgos ambientales, si se respetan las instrucciones de uso de esta etiqueta. No tóxico para peces, aves ni abejas.

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE LA SALUD”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES NI EQUIPO DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESE AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

La técnica del Triple Lavado, se describe a continuación:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Teléfonos de Emergencia:

Avance Biotechnologies, Chile: (2) 2623 32 66

Médico Avance: (09) 9338 49 97

RITA-CHILE: (2) 2777 19 94 / 2661 94 14

3 TAEX

FUNGICIDA PASTA (PA)

3 TAEX es una barrera bio-mecánica preventiva frente al ataque de las enfermedades y cultivos indicados en las instrucciones de uso.

Composición:

Trichoderma viride Cepa T-26.....0,10% p/v (1,0 g/L)
Trichoderma harzianum Cepa T-22.....0,11% p/v (1,1 g/L)
Trichoderma longibrachiatum Cepa T-397.....0,116% p/v (1,16 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.664

**NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO
NO CORROSIVO**

Lote N°:

Fecha de Fabricación (mes y año):

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 3,78 Litros

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Fabricado por:

Pinturas Renner S.A.
Av. Las Américas 221
Cerrillos – Santiago
Chile

Distribuido por:

Avance Biotechnologies, Chile S.A.
Calle Nueva N° 5367
Conchalí – Santiago
Chile

INSTRUCCIONES DE USO

3 TAEX es una pintura sellante de heridas de cortes de poda con un indicador de uso orgánico color celeste. Es un producto de acción preventiva antes que curativa, frente al ataque de las enfermedades y cultivos indicados en las instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Especie	Patógeno	Momento de Aplicación	Observaciones
Manzano Peral Duraznero Guindo Cerezo Olivo Kiwi	Plateado (<i>Chondrostereum sp.</i>) Fusarium (<i>F. oxysporum</i> , <i>F. solani</i> , <i>F. roseum</i> , <i>F. verticilloides</i> y <i>F. moniliforme</i>), <i>Botrytis</i> , <i>Heterobasidium</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Penicillium</i>		
Arándano	<i>Fusicocum sp.</i> , Fusarium (<i>F. oxysporum</i> , <i>F. solani</i> , <i>F. roseum</i> , <i>F. verticilloides</i> y <i>F. moniliforme</i>), <i>Botrytis</i> , <i>Penicillium</i> , Plateado (<i>Chondrostereum sp.</i>).	Inmediatamente después de la poda	Pincelar hasta cubrir la zona del corte. Realizar como máximo dos aplicaciones por temporada.
Uva de mesa Uva vinífera Uva pisquera	Enrollamiento clorótico (<i>Fomitiporella</i>), Fusarium (<i>F. oxysporum</i> , <i>F. solani</i> , <i>F. roseum</i> , <i>F. verticilloides</i> y <i>F. moniliforme</i>), <i>Botrytis</i> , <i>Penicillium</i>		
Pino radiata	<i>Gloeophillum coriolus</i> . <i>Aspergillus</i>		

Forma de aplicación: para prevenir enfermedades de la madera. 3 TAEX se aplica como pintura sobre cortes, inmediatamente después de podar.

No aplicar durante la lluvia

3 TAEX viene formulado para su uso directo. Antes de usar el producto, agite el envase. No debe ser diluido, es decir se aplica en forma de pintura utilizando brocha o pompones.

3 TAEX no debe ser aplicado si existe riesgo de lluvia dentro de las 6 horas siguientes a la aplicación.

Rinde 17 Mts² por litro

Número de aplicaciones por temporada: Realizar como máximo dos aplicaciones por temporada.

Incompatibilidad: No mezclar con fungicidas y/o compuestos en base a sales de cobre.

Fitotoxicidad: 3 TAEX no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Tiempo de Reingreso al Área Tratada (personas y animales): Por la forma de su uso no hay restricciones de reingreso al área tratada.

Periodo de carencia: Por la forma y época de aplicación no es aplicable la carencia.

Nota: No utilice 3 TAEX en cortes de plantas o partes vegetales destinadas directamente al consumo humano o animal.

Avance Biotechnologies, Chile:

Sistema de Gestión y Calidad Bajo norma ISO 9001:2000



CUIDADO

