

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: ACRAMITE® 50 WP contiene bifenazato perteneciente al grupo químico de los Carbazatos. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

Durante la preparación y manipulación, usar guantes de goma, botas de goma, protector facial, mascarilla, ropa protectora adecuada, overol impermeable y delantal impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, protector facial y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. Evitar al preparar que el producto contamine aguas de lagos, ríos u otros cursos de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar, ir al baño y después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos. Puede irritar sistema respiratorio, piel y ojos.

Primeros auxilios: Contacto con los ojos: Efectuar un lavado ocular con abundante agua por 10 a 15 minutos, mantener los párpados separados durante el procedimiento. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlas y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar al médico. **Contacto con la piel:** Lavar con agua la superficie afectada. Remover y lavar las ropas contaminadas. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Consultar al médico. **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco y consultar al médico. **Ingestión:** No inducir el vómito y consultar al médico.

Tratamiento médico de emergencia: Información para el médico tratante. El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico Carbazatos. Las medidas generales de tratamiento son: descontaminación gastrointestinal, donde puede ser necesario realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado y un laxante tipo salino. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: ACRAMITE® 50 WP es seguro para insectos depredadores; selectivos para ácaros depredadores de araña y ligeramente tóxico para abejas expuestas al tratamiento directo con el producto. Sin embargo, el residuo del producto en las hojas de los frutales no presenta ningún riesgo para abejas. No se recomienda la aplicación del producto mientras las abejas se encuentran en máxima actividad. ACRAMITE® 50 WP es moderadamente tóxico a peces. No contamine cursos de agua. Moderadamente tóxico para aves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS, Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

NO APLICAR EN FLORACIÓN, TÓXICO PARA ABEJAS.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de Informaciones Toxicológicas de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA/Chile: 2 2777 1994, Santiago. En caso de Emergencias Químicas llamar a RITA/Chile al fono: 2 2777 1994, Santiago. El teléfono del importador es: 2 2560 4500.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en la etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido del ingrediente activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

©ACRAMITE es marca registrada.



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.626

ACRAMITE® 50 WP es un acaricida para el control de Araña roja europea, Araña bimaiculada, Araña roja de los cítricos, Araña roja del palto y Araña roja del parronal que afectan a los frutales, tal como se detalla en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:
 Bifenazato* 50 % p/p (500 g/kg)
 Coformulantes, c.s.p. 100 % p/p (1 kg)
 *3-(4-metoxifenil-3-il) carbazato de isopropilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Cont. Neto:

Fabricado por:
LANXESS Solutions US Inc.
 214 West Ruby Avenue NC 28054-2337- Gastonia
 Estados Unidos

ADAMA
 83 Vernon Drive Tifton, GA31793
 Estados Unidos

GOWAN MILLING
 12300 E County 8th St, Yuma, AZ 85365,
 Estados Unidos

UPL Limited
 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway,
 Bandra-East, Mumbai 400 051,
 India.

Importado y distribuido por:
ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
 El Rosal 4610, Huechuraba
 Santiago - Chile
 ET1626-V006-OS1

INSTRUCCIONES DE USO

ACRAMITE® 50 WP Controla eficientemente: Araña roja europea, Araña bimaiculada, Araña roja de los cítricos, Araña roja del palto y Araña roja del parronal, que afectan a los frutales.

ACRAMITE® 50 WP posee acción de contacto, con efecto sobre los receptores GABA, afectando la transmisión del sistema nervioso. Controla todos los estados móviles de los ácaros y huevos en algunas especies, los cuales al estar en contacto con el producto, dejan de alimentarse y mueren 72 a 96 horas después. **ACRAMITE® 50 WP** tiene acción de volteo y efecto residual prolongado, las arañas que van naciendo son controladas al ingerir residuos de las hojas y frutos. **ACRAMITE® 50 WP** aplicado según las recomendaciones de esta etiqueta es selectivo a enemigos naturales de arañas, siendo entonces un producto ideal para M.I.P.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN TERRESTRE:

Dosis y aplicación: Iniciar los tratamientos en cuanto aparezcan las primeras arañas (0.5 a 3 en promedio por hoja).

Cultivo	Plaga	Dosis	Observación
Manzanos, Perales, Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos, Almendros.	Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>) Araña bimaiculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 a 50 g/100 L de agua (1 - 1,25 kg/ha)	En todos los casos, la gota debe ser fina (100 a 200 micrones). Se recomienda aplicar una vez al año para evitar desarrollo de resistencia. No aplicar en plena floración. Aplicar con buen cubrimiento de follaje. Respetar los períodos de carencia señalados en la etiqueta.
Nogales	Araña bimaiculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 a 100 g/100 L de agua (1,25 - 2,5 kg/ha)	Se recomienda aplicar una vez al año para evitar desarrollo de resistencia. No aplicar en plena floración. Aplicar con buen cubrimiento de follaje. Para el control de huevos aplique la dosis de 75 a 100 g/100L de agua, utilizando la mayor concentración cuando la presión sea alta. Respetar los períodos de carencia señalados en la etiqueta.
Cítricos: Limoneros, Naranjos, Limas, Mandarinos, Clementinas, Clementules, Murcotts y sus híbridos, Tangerinos y Pomelos.	Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	50 a 100 g/100 L de agua (0,9 - 1,75 kg/ha)	Aplicar cuando aparezcan los primeros ejemplares. Si persiste la presión de ácaros repetir a los 21 días si fuese necesario, alternado acaricidas de diferentes grupos químicos. Aplicar con buen cubrimiento de follaje. Respetar los períodos de carencia señalados en la etiqueta.
Paltos	Araña roja del palto (<i>Oligonychus yotheri</i>)	40 a 60 g/100 L de agua (0,8 - 1,8 kg/ha)	Aplicar cuando aparezcan los primeros ejemplares (estados móviles) utilizar un buen cubrimiento. Respetar siempre el período de carencia señalado en la etiqueta.
Vides (Uva de mesa, pisquera y vinifera)	Araña roja del parronal (<i>Oligonychus vitis</i>)	60 a 90 gr/100 L de agua (0,9 - 1,35 kg/ha)	Aplicar cuando aparezcan los primeros ejemplares (estados móviles) utilizar un buen cubrimiento. Respetar siempre el período de carencia señalado en la etiqueta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN AÉREA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observación
Paltos	Araña roja del palto (<i>Oligonychus yotheri</i>)	(0,8 - 1,8 kg/ha)	Aplicar cuando aparezcan los primeros ejemplares. Si persiste la presión de ácaros repetir a los 21 días si fuese necesario, alternado acaricidas de diferentes grupos químicos. Aplicar con buen cubrimiento de follaje. Respetar siempre el período de carencia señalado en la etiqueta.

APLICACIÓN: para el caso de aplicaciones terrestres, utilizar los siguientes mojamientos: para pomáceas, carozos y nogales: 2.500 L de agua/ha; para cítricos utilizar 1.750 L de agua/ha, para paltos de 2.000 a 3.000 L de agua/ha y para vides: 1.500 L de agua /ha. En plantaciones nuevas se puede usar volumen de agua inferiores al indicado en cada cultivo respetando las concentraciones y/o dosis/ha. En el caso de aplicación aérea utilizar un volumen de aplicación entre 40 - 60 L de agua/ha o según sistema de aplicación aérea a utilizar. Evitar deriva.

TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN, RETIRAR COLMENAS DEL ÁREA A TRATAR PREVIO A LA APLICACIÓN.

Preparación de la mezcla: Nota: La bolsa hidrosoluble no debe romperse. Utilizarla completa. Llenar el tanque con agua hasta la mitad. Preparar una mezcla de **ACRAMITE® 50 WP** con agua hasta formar una crema fluida, luego adicionarla al tanque y completar al volumen requerido con agitación. De utilizar surfactante agregar al final del proceso. **Compatibilidad:** **ACRAMITE® 50 WP** es compatible con coadyuvantes siliconados.

Incompatibilidad: No mezclar con insecticidas organofosforados, carbamatos o con productos de reacción alcalina. Para mezclas con otros productos fitosanitarios consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: **ACRAMITE® 50 WP** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, aún en variedades muy sensibles, cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Períodos de carencia: Almendras, Duraznos y Nectarines: 20 días. Uvas: 14 días. Limones, Naranjos, Limas, Mandarinas, Clementinas, Clementules, Murcotts y sus híbridos, Tangerinas, Pomelos, Ciruelas, Cerezas, Manzanas, Peras y Paltos: 7 días. Nueces: Por el modo de acción del producto y el tipo de fruto que pierde el pelón no se establece carencia. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso al área tratada (personas y animales): Se recomienda aguardar 12 horas después de la aplicación para el ingreso de personas. No corresponde reingreso de animales, ya que los cultivos en que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.

Condiciones determinantes para su aplicación: No aplicar con viento de más de 10 km/h, ni cuando se esperen lluvias dentro de las 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.



CUIDADO



PANTONE 347 C

PANTONE NEGRO 100%