320 mm

Helvetica Neue condensed 7

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Oxicloruro de cobre y Sulfato Básico de Cobre pertenecen al grupo químico de los compuestos de cobre. Azufre, pertenece al grupo químico de los calcógenos.

CUSDUST PLUS, es un fungicida - bactericida a base de Cobre y Azufre, que se considera ligeramente tóxico para los humanos y animales.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de Protección Personal: Durante la preparación usar de protección: antiparras, mascarilla para polvos, guantes impermeables, botas de goma y overol impermeable. Durante la aplicación usar de protección: antiparras, mascarilla para polvos, guantes impermeables, botas de goma y overol impermeable.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes

Ecotoxicología: A la dosis de aplicación recomendada. **CUSDUST PLUS** no es dañino al medio ambiente, ni peligrosos a peces, aves y abejas.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: No existe antídoto conocido.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. NO INDUCIR EL VÓMITO. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de contacto cutáneo: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Se es necesario acudir a un médico.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. De ser necesario consiga ayuda médica inmediatamente.

Tratamiento médico de emergencia: Hacer lavado gástrico por una persona capacitada o bajo supervisión de un profesional. En caso de ingestión ABC de reanimación, lavado gástrico. Dar carbón activado y catártico salino. Si el paciente está sintomático, suministrar: BAL (Dimercaprol) 3-5 mg/kg/dosis. Penicilamina 250 mg 4 veces al día por 5 días.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.
GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio Santiago, Chile. CITUC/AFIPA.,o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500.

Helvetica Neue condensed 7 - 9 -27

CUSDUST PLUS

Fungicida - Bactericida
Polvo Seco
(DP)

Lote Nº :
Fecha de Venc:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.629-O

CUSDUST PLUS es un fungicida-bactericida preventivo de contacto, recomendado para el control de Pudrición ácida y Oídio en Vides.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:	**% p/p**
Oxicloruro de Cobre*	19.5 % p/p (195 g/kg)
Sulfato tribásico de Cobre**	7.6 % p/p (76 g/kg)
Azufre	72,9% p/p (729 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)

*Cloruro trihidróxido dicúpico (equivalente a 11,3% p/p (113 g/kg) de cobre)
** Sulfato hexahidróxido tetracúprico (equivalente a 3,7% p/p (37 g/kg) de cobre)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto: kg.

Fabricado por:

Agrospec S.A.
Camino El Milagro 257
Maipú - Santiago, Chile
Telefono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

UPL Limited
610 B/2, Bandra Village,
Off Western Express Highway,
Bandra-East, Mumbai 400 051,
India

Distribuido por:

ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
UNA EMPRESA UPL

El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET2629-V003-OS1
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
https://www.upl-ltd.com/cl

Helvetica Neue condensed 7

INSTRUCCIONES DE USO:

Descripción:

CUSDUST PLUS es un fungicida-bactericida preventivo de contacto, recomendado para el control de Pudrición ácida y Oídio en Vides, gracias al contenido de cobre y azufre presente en la mezcla.

Instrucciones de uso:

Equipo de aplicación: Espolvoreador

Equipo de aplicación aérea: Avionetas o helicóptero agrícola.

Cuadro de instrucciones de usos para aplicaciones terrestres y aéreas:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Pudrición ácida: Complejo de hongos asociados (*Rhizopus spp., Aspergillus niger, Cladosporium spp., Penicillium spp.*), Oídio (*Uncinula necator*), bacterias (*Acetobacter spp., Bacillus spp.*), y levaduras (*Saccharomyces spp., Kloeckera apiculata*)	20 kg/ha	Iniciar las aplicaciones en pinta (10-12º brix), y repetir cada 15 días. En caso de presiones fuertes de oídio y pudrición ácida, aplicar cada 7 a 10 días. Número máximo de aplicaciones: 3

AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA.

El número de aplicaciones de **CUSDUST PLUS** depende de la variedad, presión de enfermedad y condiciones climáticas. Pero se recomienda realizar para el caso de variedades tempranas entre 1 y 2 aplicaciones y para el caso de variedades tardías entre 2 y 3 aplicaciones por temporada.

La última se debe realizar lo mas cercano a cosecha.

Para una aplicacion segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas Tº (mayores a 28ºC).

Preparación de la mezcla:

Para cada una de las aplicaciones, agregar **CUSDUST PLUS** al estanque del espolvoreador y aplicar.

Carencia: (días)

No posee carencia.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso comun.

Incompatibilidad:

Evitar aplicar en mezcla con Thiram y Dinitros, o productos alcalinos y ácidos. No aplicar con Clorpirifos y con formulaciones que contengan aceites.

Reingreso al área tratada:

No ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación, en el caso de animales no corresponde, debido a que el objetivo productivo no es el consumo animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

USO EXCLUSIVO SAG

24,80 mm