

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Diuron, ingrediente activo de DOGMA® 800 WG, pertenece al grupo químico Ureas. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. El producto es corrosivo al Hierro y Aluminio. Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, protector facial, delantal impermeable y bótas de goma resistentes a productos químicos. Durante la aplicación usar guantes impermeables, bótas de goma resistentes a productos químicos, mascarilla con filtro, antiparras de seguridad y overol impermeable. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si el producto entra en contacto con los ojos, puede causar irritación ocular. Si entra en contacto con la piel, puede causar irritación moderada. Al ser inhalado puede causar irritación nasal y a la garganta. Si el producto es ingerido, los síntomas pueden ser: náuseas, vómitos y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. Tratamiento médico de emergencia: La administración de lavado gástrico u oxígeno debe ser realizado por personal médico calificado. Se recomienda lavado gástrico y catarsis cuando se han ingerido grandes cantidades del producto. Mantener la presión sanguínea y las vías respiratorias despejadas. No hacer lavado gástrico a una persona inconsciente. Antídoto: No tiene antídoto específico. ECOTOXICIDAD: Ligeramente tóxico a peces, prácticamente no tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. No hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3561

DOGMA® 800 WG, es un herbicida de suelo activo para el control de malezas de hoja angosta y hoja ancha en huertos Frutales, Viñas y Parronales, Frutales menores, Espárragos, Alcachofas, Praderas, Cereales, Flores, en la preparación de sitios eriazos para uso agrícola, limpieza invernal de Canales de regadío y Drenes de uso agrícola-forestal, según las instrucciones del cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN

*Diuron.....80% p/p (800 g/kg)
Coformulantes c.s.p.....100% p/p (1 kg)
*3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetil urea

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cont. Neto: 15 Kilos

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Fabricado por: UPL Sud África Pty Ltd. PO Box 1726, Mount Edgecombe, 4300 - Sud África
Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town Feng Xian District, Shanghai 201405 - China.
Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Qingling Village, Xining Town, Guangde County, 242235, Anhui - China.
UPL Limited. 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra-East, Mumbai 400 051, India.
Distribuye: ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A. El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago, Chile. ET3562V-004-15 OS2

INSTRUCCIONES DE USO: DOGMA® 800 WG, es un herbicida suelo-activo recomendado para el control selectivo de las malezas de hoja ancha anuales: Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), Bledo (Amaranthus spp.), Bolita del pastor (Capsella bursa-pastoris), Capulí (Physalis spp.), Cerastio (Cerastium spp.), Duraznillo (Polygonum persicaria), Enredadera (Fallopia convolvulus), Falsa achicoria (Cichorium spp.), Hierba caña (Senecio vulgaris), Linacilla (Spergularia arvensis), Manzanilla (Anthemis spp.), Mostacilla, (Sisymbrium, Rapistrum spp), Nilhue (Sonchus spp.), Quiloi quiloi (Stellaria media), Quinguilla (Chenopodium album), Rábano (Raphanus spp.), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Verdolaga (Portulaca oleracea), Yujo (Brassica rapa) y de las Gramíneas anuales: Cola de ratón (Hordeum spp.; Vulpia spp.), Hualcalcho (Echinochloa spp.), Pasto miel (Holcus lanatus), Pasto oloroso (Anthraxanthum odoratum), Pata de gallina (Digitaria sanguinalis), Pega-pega (Setaria viridis) y Piñillo (Poa spp.) en los cultivos descritos en el Cuadro de Instrucciones de Uso. DOGMA® 800 WG, modo de acción es la inhibición de la fotosíntesis produciendo clorosis y muerte del tejido verde de las malezas susceptibles. Absorbido principalmente por la raíces, su translocación es acropétala (hacia arriba) a través del xilema por donde se distribuye a toda la planta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Table with 3 columns: CULTIVO, DOSIS (kg/ha), OBSERVACIONES. Rows include Alcachofa, Cereales (Avena, Cebada, Trigo), Espárragos, Flores (Gladíolos), Frutales (Almendros, Cerezos, Ciruelos, Clementinos, Durazneros, Granados, Kiwi, Limoneros, Mandarinos, Manzanos, Membrillos, Naranos, Nectarines, Nogal, Olivos, Palto, Perales, Pomeños, Tangelos), Frutales menores (Arándanos, Frambuesos, Moras), Praderas (Alfalfa establecida), Praderas (Festuca, Pasto ovillo), Viñas y Parronales, and Preparación de sitios eriazos para uso agrícola.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Medir la cantidad necesaria de DOGMA® 800 WG, adicione ésta directamente al estanque aplicador a medio llenar o bien previamente disuelto en agua y con el agitador funcionando, por último terminar de llenar el tanque con agua.

APLICACIÓN: La aplicación se realiza vía terrestre y debe ser hecha preferentemente sobre suelos limpios y húmedos, en lo posible antes o después de una lluvia usando una pulverizadora neumática o de Ultra Bajo Volumen ya sea en forma total o bien localizada sobre la banda de plantación dependiendo del tipo de cultivo y/o situación. Se sugiere regar vía micro aspersión o aspersión para activar el herbicida si no llueve dentro de las 2 semanas siguientes de la aplicación. DOGMA® 800 WG se debe aplicar siempre en suelos bien preparados, mullidos, sin terrones, sin malezas presentes y con buena humedad o donde se esperen lluvias o riego artificial antes de dos semanas después de realizada la aplicación de DOGMA® 800 WG. Para todos los cultivos se recomienda emplear las dosis menores en suelos livianos de tipo arenoso a franco-arenoso y las dosis mayores en suelos más pesados de clase textural arcillosos y franco-arcillosos.

Otras informaciones: Existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas. Estos biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes con el uso repetido de herbicidas del grupo HRAC: C/WSSA: 7 al cual pertenece el herbicida DOGMA® 800 WG, por lo que el nivel de control será afectado seriamente. Como una estrategia de antiresistencia es recomendable complementar la aplicación de DOGMA® 800 WG con otros herbicidas con diferentes grupos químicos y/o con modos de acción totalmente diferente. La aparición de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de DOGMA® 800 WG, por lo que Arysta LifeScience Chile S.A. no se hace responsable por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. En caso de duda consultar a nuestro Departamento Técnico, o al especialista de su confianza. Debido a la naturaleza variable de los factores que inciden en la aplicación de este producto, no se da garantía de ninguna clase con respecto a sus efectos. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación.

COMPATIBILIDADES: Para mejorar el espectro de malezas presentes, DOGMA® 800 WG puede usarse en mezcla con MCPA, Hexazinona, Metribuzina, Glifosato y agentes humectantes, en post emergencia de las malezas posterior a una evaluación de selectividad y compatibilidad.

INCOMPATIBILIDADES: Es muy importante que DOGMA® 800 WG no sea mezclado con las formulaciones líquidas de otros herbicidas compatibles en su forma concentrada. No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes. No mezclar con otros productos sin consultar previamente a nuestro Departamento técnico.

FITOTOXICIDAD: DOGMA® 800 WG puede ser dañino a cultivos cercanos, por lo tanto, se deben tomar las precauciones necesarias evitando la deriva y el traslape de la aplicación a cultivos cercanos. En frutales y viñes, lluvias intensas posteriores a la aplicación pueden traducirse en fitotoxicidad. DOGMA® 800 WG no es fitotóxico cuando es aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados. Para rotación con cultivos no especificados en la etiqueta guarde un periodo de 2 años. Numerosos factores, como por ejemplo, calidad de la semilla y siembra, tipo de suelo, contenido de materia orgánica, exceso de agua o sequía, heladas, plagas o enfermedades y otras pueden causar debilitamiento de las siembras o cultivos influyendo sobre los resultados de la aplicación. Cuando dichas condiciones son extremas, se recomienda abstenerse de aplicar DOGMA® 800 WG. Debido a ello, nuestras indicaciones se entienden para cultivos desarrollados en condiciones y épocas normales. Bajo estas condiciones no hay fitotoxicidad.

PERIODO DE CARENIA (DÍAS): No corresponde por la época de aplicación. TIEMPO DE REINGRESO: Las personas no debe reingresar al área tratada hasta 12 horas después de su aplicación. En el caso de Praderas, el ganado en pastoreo no debe ingresar al área tratada hasta 70 días después de efectuada la aplicación.

© DOGMA es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.

