

FAST 1.8 EC

INSECTICIDA-ACARICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.509

FAST 1.8 EC, insecticida-acaricida de origen natural, de largo efecto residual y efectivo en el control de ácaros, larvas minadoras, moscas blancas, trips en los cultivos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Abamectina (*)	1.8% p/v (18 g/l)
Cofomulantes, c.s.p.	100% p/v (1 l)
(*) Abamectina es una mezcla de:	
Avermectina B1a (**)	80% (máximo)
Avermectina B1b (***)	20% (máximo)
(**) 5-O-desmetilavermectina A1a	
(***) 5-O-desmetil-25-des-(1-metilpropil)-25-(1-metiletil)avermectina A1a	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300

Providencia

SANTIAGO - CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA - CHILE

HUALONG CHEMICAL INDUSTRY Co. Ltd.

1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road Hangzhou 310004 - CHINA

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903) Melchor Romero, La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

FAST 1.8 EC, insecticida-acaricida cuyo ingrediente activo abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<<ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS>>

Riesgos Ambientales: FAST 1.8 EC, es ligeramente tóxico a aves, muy tóxico a peces, extremadamente tóxico a microcrustáceos acuáticos. Altamente tóxico a abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUAS>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

Instrucciones para el triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar vaciamiento gástrico cuidadoso. Luego administrar vaselina líquida como diluyente y laxante. No realizar lavado gástrico. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. **Contraindicaciones:** Barbitúricos o benzodiazepinas.

Primeros auxilios: **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos con abundante agua corriente fría por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlas y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. **En caso de ingestión:** Mantener al afectado en reposo y NO PROVOCAR EL VOMITO por riesgo de aspiración. Proceder al traslado al hospital más cercano. **Síntomas de intoxicación:** Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve. Convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **FAST 1.8 EC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

FAST 1.8 EC, insecticida- acaricida de origen natural para el control de ácaros, larvas minadoras, mosquitas blancas y trips.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (cc/100 L de agua)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Peral, Manzano, Membrillo	Arañitas Roja, Parda, Bimaculada, Acaro del Russet del peral, Erinosis del peral, Trips de california	60 a 80	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, con buen cubrimiento. Repetir si es necesario. En trips californiano se recomienda una dosis de 80 a 100 cc/100 L de agua.	10
Vid, Kiwi	Arañita roja, Arañita parda, arañita bimaculada, falsa arañita roja de la vid, Erinosis, Trips de la uva	50 a 80	Comenzar las aplicaciones entre yema algodonosa y brotes de 10 a 15 cm para control de falsa arañita.	Vid: 10 Kiwi: 14
	Trips de california	80 a 100	Realizar 3 aplicaciones comenzando muy temprano en la temporada entre inicio de floración y el término de ella. En Kiwi atenerse a medidas de protección para las abejas.	
Frambuesa, Frutilla, Arándano, Zarpaparrilla, Mora	Arañita bimaculada, Arañita roja, Trips, Falsa arañita roja de la vid, Eriofido de la mora	60 a 100	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares móviles. En falsa arañita asegurar buen cubrimiento de plantas y envés de las hojas. Repetir después de la cosecha. En frutilla aplicar 0,5 – 1,2 L/ha.	Frambuesa, Frutilla, Mora: 3 Arándano, Zarpaparrilla: 10
Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Nectarino, Nogal	Arañita roja, arañita parda, arañita bimaculada, Acaro del plateado.	60 a 80	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, con alto volumen de agua por ha.	Almendro, Nectarino, Cerezo, Damasco, Durazno: 7 Nogal: 14 Ciruelo: 21
	Trips de california	80 a 100	Iniciar aplicaciones en pre-flor. Repetir después de caída de pétalos, considerando las medidas de protección para las abejas. Repetir 20 a 25 días antes de la cosecha.	
Naranja, Limonero, Pomelo, Mandarina, Clementina, Tangelo	Arañita roja de los cítricos, Acaro de la yema, falsa arañita roja de la vid.	60	Aplicar al observar los primeros ejemplares y al hinchar las yemas en caso del ácaro de las yemas. Aplicar altos volúmenes de agua 6.000 a 10.000 L/ha, se recomienda reducir la concentración por 100 L, de modo de aplicar un máximo de 2,0 L/ha de FAST 1.8 EC .	7
Palto, Chirimoyo	Arañita roja del palto, Falsa arañita de la vid, Trips del palto	60 a 100	Aplicar temprano en la temporada al aparecer los primeros ejemplares.	14
Tomate, Pimiento, Apio	Acaro del tostado, (Aculops L.), Arañita bimaculada, Mosca blanca, Minador de las chacras, Polilla del tomate, Mosquita blanca y Trips Californiano.	60 a 80 o 0,5 L/ha	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Repetir con reinfestación. Utilizar el rango alto de la dosis para el control de larvas de insectos.	Tomate y Pimiento: 3 Apio: 10
Melón, Sandía, Zapallo, Zapallito, Pepino	Arañita bimaculada, Arañita roja, desérticola, Minador de las hortalizas	70 a 100 o 0,6 L/ha	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, cubriendo especialmente el envés de las hojas. Repetir en caso de reinfestación.	Melón, Sandía, Pepino, Zapallito: 3 Zapallo: 7
Remolacha azucarera, Betarraga, Acelga, Espinaca, Arveja, Lechuga	Minador de las chacras Arañita roja europea	70 a 100 o 0,5 L/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares y repetir con reinfestación. Utilizar el rango alto de la dosis para el control de larvas de insectos. En general se recomienda muy buena cobertura empleando alto volumen de agua.	10
Maíz	Arañita bimaculada	0,5 L/ha	Aplicar con densidad crítica de la plaga, cubriendo con volumen mayor a 800 l/ha y mojado el envés de la hoja.	18
Ornamentales (clavele, rosa, crisantemo)	Minadores de hoja, Arañita roja europea.	50 a 70 o 0,6 L/ha	Aplicar cuando se observen los primeros ejemplares con abundante volumen de agua. Repetir en caso de reinfestación. En otras especies de plantas ornamentales, se recomienda probar previamente la susceptibilidad del cultivo al producto	N.C.

N.C.: No Corresponde.

Instrucciones de uso:

- Aunque los ácaros e insectos no mueren en forma inmediata, estos dejan de causar daño después de la aplicación de **FAST 1.8 EC**.
- Repetir dependiendo del monitoreo de los ejemplares no antes de 2 semanas.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 km/hr.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30 °C).
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.
- No aplicar más de 3 veces por temporada. En palto y chirimoyo aplicar máximo 2 veces por temporada. En ciruelo aplicar máximo 1 vez por temporada.
- Volúmenes de agua sugeridos para aplicación: Pomáceas: 1500 – 2000 L/ha; Vid vinifera: 700 - 1500 L/ha; Vid de mesa: 1200 - 2000 L/ha; Kiwi: 1500 – 2000 L/ha; Berries: 400 - 1000 L/ha; Carozos: 1200 – 2000 L/ha; Hortalizas 200 – 600 L/ha; Tomate 200 – 1000 L/ha; Cítricos, Palto y Chirimoyo 2000 – 3000 L/ha.

RIESGOS PARA LAS ABEJAS – Medidas de protección: FAST 1.8 EC es considerado TÓXICO A ABEJAS por lo que aplicaciones de FAST 1.8 EC a huertos o cultivos en floración pueden causar toxicidad a las abejas presentes. El producto es tóxico a

las abejas expuestas a la aspersión directa o a depósitos del producto en los cultivos o en malezas en floración. No aplicar durante la floración del cultivo, con flores abiertas (atrayentes para abejas), ni con malezas en floración o vegetación cercana en floración. Se deben retirar todas las colmenas del huerto previo a la aplicación de FAST 1.8 EC. Se recomienda mantener las abejas alejadas de los cultivos tratados hasta 2 días después de la aplicación de FAST 1.8 EC. Malezas en floración u otra vegetación en floración se recomienda cortarlas o controlarlas antes de la aplicación de FAST 1.8 EC.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de **FAST 1.8 EC** y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante. En caso de usar con aceite, agregar este a la mezcla previamente diluido en agua.

Compatibilidad: Es compatible ULTRASPRAY y con la mayoría de los insecticidas de uso común. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas de compatibilidad antes de efectuar mezclas con otros productos.

Incompatibilidad: Es incompatible con Captan, Cyhexatin, Azufre y cualquier otro producto que no pueda mezclarse con aceite. Es incompatible con soluciones fuertemente alcalinas.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



NOCIVO

