

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: FUNGAZIL® 500 EC es un producto en base a Imazalilo perteneciente al grupo químico de los Imidazoles.

Durante su **preparación** y **aplicación** debe usarse como protección antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables, overol impermeable y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. Después de manipular el producto, lavarse con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Mantener el producto siempre en su envase original debidamente cerrado, etiquetado, en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Información Ecotoxicológica: FUNGAZIL® 500 EC es moderadamente tóxico para peces, microcrustáceos, algas. No tóxico para abejas y aves.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“EN APLICACIONES DE POSTCOSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN”

Instrucciones para el Triple Lavado

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: Decaimiento, temblores, hipotermia, vómitos, diarrea, salivación, lagrimeo.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a utilizar. Si la irritación persiste, consultar con un especialista.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista.

Ingestión: **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Inhalación: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Colocar al paciente tendido en posición horizontal, tapanlo y mantenerle el calor. Llame inmediatamente al médico.

Antídoto: No se conoce antídoto específico

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (56-2) 2777 1994 - SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A. +56 228350500

FUNGAZIL® 500 EC

FUNGICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

FUNGAZIL® 500 EC es un fungicida de contacto para el control de enfermedades de post cosecha indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en cítricos.

COMPOSICION:

Imazalilo*50% p/v (500 g/L)
Coformulantes c.s.p.100% p/v (1 L)

*(RS)-1-(β-aliloxi-2,4-diclorofenil)imidazol

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
N° 2.912**

**<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO >>**

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: Litro

Fabricado por:

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turmhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Bélgica

Kwizda Agro GmbH
2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1
Austria

Importado y Distribuido por:

SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.
Avda. Presidente Kennedy 5735 - Of.1601 - Torre
Poniente
Las Condes - Santiago de Chile
Teléfono: +56 228350500

 **Pace International**
División Postcosecha
SUMITOMO CHEMICAL CHILE

INSTRUCCIONES DE USO:

FUNGAZIL® 500 EC es un fungicida indicado para el control de enfermedades de post cosecha en cítricos, como se aprecia en el cuadro de instrucciones de uso. Posee prolongado efecto residual

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Limonero Mandarino Clementino Naranja Pomelo	Moho azul <i>Penicillium italicum</i> Moho verde <i>Penicillium digitatum</i> Phomopsis Diplodia	100 cc/100 L agua (Aplicación sistema ducha)	Para aspersión a bajo volumen en línea de empaque: usar 200 a 300 cc/100 L agua. Para incorporación en ceras usar 2.000 a 4.000 ppm equivalente a 800 a 1.600 cc/200 kg de cera (no exceder un kilo de la mezcla/tonelada de fruta). Utilizar la dosis mayor cuando la fruta ha sido cosechada en condiciones de alta humedad y se requiere guardar por tiempo prolongado. El sistema a utilizar depende de la infraestructura del usuario.

Preparación de la mezcla: Agitar el envase antes de usarlo. Diluir el producto en agua de tratamiento por medio de agitación y con dicha mezcla duchar o sumergir las frutas a tratar. Si la mezcla ha sido preparada con mucha anticipación (más de 5 horas) es conveniente agitarla antes de proceder al mojado.

Compatibilidad: Compatible con ceras.


Incompatibilidad: Se recomienda no mezclar con otros pesticidas. Si es necesario mezclar es aconsejable realizar una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad: No se ha detectado fitotoxicidad cuando el producto es utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso

Tiempo de Reingreso: Dada la naturaleza de aplicación no corresponde definir tiempo de reingreso al área de aplicación para personas ni animales.

Periodo de Carencia: Limonero, Mandarino, Clementino, Naranja, Pomelo: 0 días. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



NOCIVO

