

PATON 50 WP

INSECTICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.517

PATON 50 WP, insecticida selectivo con gran capacidad de volteo y rápida acción, específico para el control de los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Pirimicarb	50 % p/p (500 g/kg)
Cofomulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)
* Dimetilcarbamato de 2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-ilo	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Pirimicarb pertenece al grupo químico de los carbamatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, mascarilla para polvos guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: PATON 50 WP, es muy tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos. Virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

Antídoto: Sulfato de Atropina. **Tratamiento médico de emergencia:** Continuar con tratamiento sintomático. NO usar Pralidoximas (Toxogonin). Si se presentan convulsiones y no existe depresión respiratoria, inyectar diazepam por vía intravenosa (0.1 mg/kg). NO usar Atropina en pacientes cianóticos, puede producir fibrilación ventricular. NO administrar opiáceos o barbitúricos.

Primeros auxilios: **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si se presenta falla respiratorio aplique respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos trasladar al paciente al hospital más cercano.

Síntomas de intoxicación: Produce los efectos secundarios de la inhibición de la colinesterasa: aumento de secreciones bronquiales, sudoración, salivación, dolor abdominal, diarrea, miosis, visión borrosa, broncoconstricción, bradicardia, cefalea, vértigo, ansiedad y confusión mental.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfono de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **PATON 50 WP** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

PATON 50 WP, insecticida selectivo con gran capacidad de volteo y rápida acción, específico para el control de Afidos o Pulgones mencionados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de instrucciones de uso terrestre:

Cultivo	Plaga	Dosis		Observaciones	Carencia (días)
		g/100 L agua	g/ha		
Duraznero, Nectarino, Damasco, Ciruelo, Cerezo	Pulgón verde del duraznero Pulgón negro del duraznero	30-50		Aplicar en primavera, al observar los primeros ejemplares ápteros. Aplicar con 1000 L de agua/ha	10
Manzanos	Pulgón lanígero	30-50		Aplicar en primavera, al observar los primeros ejemplares ápteros. Aplicar con 1000 L de agua/ha	21
Naranja, Limón, Tangelo	Pulgón negro de los cítricos Pulgón verde del duraznero	20-30		Aplicar al observar los primeros ejemplares. Usar mojamientos que permitan mojar todo el follaje. Aplicar con 2000 L de agua/ha	10
Berenjena, Papa, Pimiento, Remolacha, Tomate, Alcachofa, Lechuga, Arveja, Melón, Repollo, Brócoli, Acelga, Sandía, Pepino	Pulgón verde del duraznero Pulgón de la papa		200-300	Aplicar cuando se observen los primeros ejemplares, sobre el cultivo. Es necesario un buen mojado.	Melón, Sandía: 3 Berenjena, Pimiento, Tomate, Lechuga, Arveja, Repollo, Acelga, Pepino: 7 Alcachofa: 10 Papa, Remolacha, Brócoli: 14
Trigo, Avena, Cebada	Pulgón de los cereales Pulgón negro de los cereales Pulgón verde pálido de las gramíneas Pulgón verde de los cereales		100-150	En aplicación aérea, volumen de agua mínimo 40 L/ha. En aplicación terrestre aplicar con cantidad de agua suficiente para un mojado total del follaje	Cereales: 14 Alfalfa: N.C. Maíz: 60
Alfalfa	Pulgón de la espiga		200-250		
Maíz	Pulgón de las crucíferas		150-200		
Raps	Pulgón del raps		200-300	Se debe mojar muy bien todo el follaje. Usar 40 L/ha de agua en aplicación aérea y no menos de 100 L/ha de agua en aplicaciones terrestres.	21
Crisantemos, Rosales	Pulgones Pulgón de las crucíferas Pulgón verde del duraznero Pulgón negro del duraznero	40		Al observar los primeros ejemplares en las hojas. Usar mojamientos que permitan mojar todo el follaje.	N.C.

N.C: No corresponde

Cuadro de instrucciones de uso aéreo:

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha	Observaciones	Carencia (días)
Trigo, Avena, Cebada	Pulgón de los cereales Pulgón negro de los cereales Pulgón verde pálido de las gramíneas Pulgón verde de los cereales	100-150	En aplicación aérea, volumen de agua mínimo 40 L/ha. En aplicación terrestre aplicar con cantidad de agua suficiente para un mojado total del follaje.	Cereales: 14 Alfalfa: N.C. Maíz: 60
Alfalfa	Pulgón de la espiga	200-250		
Maíz	Pulgón de las crucíferas	150-200		
Raps	Pulgón del raps	200-300	Se debe mojar muy bien todo el follaje. Usar 40 L/ha de agua en aplicación aérea y no menos de 100 L/ha de agua en aplicaciones terrestres.	21

N.C: No corresponde

Instrucciones de uso:

- Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer, para evitar horas de más temperatura.
- Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización.
- Para aplicaciones aéreas utilizar 40 L de agua/ha en caso de aplicaciones aéreas
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora en aplicaciones terrestre y aéreas.
- No realizar más de 3 aplicaciones durante la temporada con un intervalo mínimo de 10 días entre una aplicación y otra
- Aplicar dosis mayor con altas presiones de la plaga y dosis menor con presiones medias a bajas.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **PATON 50 WP** y rellenar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: **PATON 50 WP**, Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de reacción neutra (Captan, Fenvalerato). En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



NOCIVO

