

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: La Cinetina pertenece al grupo químico de las Citoquininas.
X-CYTE®, es un fitorregulador que contiene Citoquininas naturales. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y a la contaminación de los alimentos. **Durante la manipulación:** Usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. **Durante la aplicación:** Usar como protección ropa adecuada que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. **X-CYTE®**, no es tóxico para aves, peces ni abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

La técnica del Triple Lavado se describe a continuación:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces. Finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de intoxicación: No se han descrito síntomas posibles de intoxicación, dada la baja toxicidad del producto.

Primeros Auxilios:

En caso de contacto cutáneo: Lavar con abundante agua la zona del cuerpo que haya entrado en contacto con el producto. **En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con agua fría por lo menos 15 minutos. **En caso de Inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire fresco. **En caso de Ingestión:** Provocar vómito, solo si la persona está consciente. Si se presenta para cualquiera de los casos anteriores (contacto cutáneo, ocular, inhalación y/o ingestión), alguna sintomatología, que pueda atribuirse al producto, consultar a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático.

Teléfono de emergencia: (2) 27335411 (Stoller de Chile), (2) 27771994 – (2) 266194141 (RITA), Fax: (56-2) 27471477.

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **X-CYTE®**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes y/o semillas.

X-CYTE®

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
FITORREGULADOR

X-CYTE, es un fitorregulador recomendado para estimular la división celular durante el crecimiento y desarrollo de frutos. Aplicar según el cuadro de instrucciones de Uso.

COMPOSICION:

Cinetina*... 0,044% p/v (0,44 g/L ≈ 0,4 g/Kg)
Coformulante c.s.p.....100% p/v (1L)

* 6-furfurilamino-9H-purina

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
N° 4187**

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Lote N° :

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

STOLLER ENTERPRISES INC.
4001 W, San Houston PrkWyN, Suite #100
Houston TX, 77043.
Estados Unidos

Fraccionadora

STOLLER DE CHILE S.A.
RUTA 5 SUR KM 192, CURICÓ,
VII Región del Maule- CHILE
Teléfono : (+56 75) 2314789
www.stoller.cl

Importado y Distribuido por:

STOLLER DE CHILE S.A.
RUTA 5 SUR KM 192, CURICÓ,
VII Región del Maule- CHILE
Teléfono : (+56 75) 2314789
www.stoller.cl

INSTRUCCIONES DE USO

X-CYTE®, es un fitorregulador recomendado para estimular la división celular durante el crecimiento y desarrollo de bayas en vides, cerezos y arándanos. **X-CYTE®**, se puede aplicar vía foliar o dirigido a la fruta, de acuerdo con el cuadro de Instrucciones de Uso.

Instrucciones de Uso:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Uva de Mesa	3	Numero de aplicación por temporada: 2 Primera: Con la 1ª etapa de crecimiento. Segunda: Con la 2ª etapa de crecimiento. Para Crimson Seedless solo se recomienda una aplicación de crecimiento. Mojamiento: 2000 – 2500 Lt/ha.
Cerezo	0,75	Numero de aplicaciones: 2. Primera: 50% de caída de pétalos. Segunda: 7 días después.
Arándano	0,75 a 1	Numero de aplicaciones: 2 a 4. Primera: Caída de pétalos. Segunda: Cada 10 días.

Modo de Aplicación: Para la aplicación por inmersión se recomienda aplicar una dosis de 1 litro de **X-CYTE®** en 100 litros de Agua (1%). Aplicando junto con la primera y segunda aplicación de Ácido Giberélico de crecimiento.

Preparación de la mezcla: Mezclar la cantidad requerida para la aplicación en el estanque del equipo aplicador lleno hasta la mitad de su capacidad, con el agitador funcionando. Luego, completar con la cantidad de agua requerida.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común.

Incompatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Tiempo de Reingreso (personas y animales): Media hora después de la aplicación.

Carencia: No tiene.

El producto no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvias, dominio de vientos fuertes, presencia de heladas ni bajo estrés hídrico en las plantas árboles en el caso del cerezo.

Nota al comprador:

El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta. Como el almacenamiento la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, los eventuales daños producidos por un mal uso o almacenamiento indebido, no son responsabilidad del vendedor.



CUIDADO

