PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: **CAPTURE 10 EC** contiene Bifentrina, perteneciente al grupo químico de los Piretroides. No aplicar **CAPTURE10 EC** en áreas ocupadas por seres humanos o animales. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. **Durante la manipulación del producto:** Utilizar: guantes impermeables, protector facial, overol impermeable y botas de goma. **Durante la aplicación:** Utilizar antiparras, mascara con filtro, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. Bañarse al finalizar la manipulación. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

Información Ecotoxicológica: No contaminar fuentes o cursos de agua. Tóxico a abejas y peces. Prácticamente no tóxico para aves. **"ES TOXICO PARA ABEJAS NO APLICAR EN FLORACIÓN"**

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS"
"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBE SER EFECTUADA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"
"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD "
"NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"
"PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE"

La técnica del Triple Lavado, se describe a continuación:
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. ***Paso 2***: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar**. *Paso 3***: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: Los síntomas en caso de envenenamiento son: temblores, malestar en general, dolor de cabeza, mareos, sudor frío, náuseas, irritación dérmica, enrojecimiento, dolor, irritación ocular, escozor de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de **contacto con la piel,** retirar las ropas y lavar la zona afectada con abundante agua, si la irritación persiste, buscar asistencia médica. En caso de **contacto con los ojos**, si usa lentes de contactos lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirar y seguir lavando hasta completar 15 a 20 minutos, si se presenta dolor o enrojecimiento, buscar asistencia médica. En **caso de ingestión**, Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llevar al afectado al servicio de urgencias médicas más cercano. En **caso de inhalación**, trasladar al afectado al aire fresco y dejarlo descansar, si la respiración está detenida, dar respiración artificial, si presenta dificultad respiratoria, dar oxígeno. Buscar asistencia médica.

Antídoto: No tiene antídotos específicos.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático. En caso de ingestión, NO PROVOCAR VOMITO, efectuar tratamiento con purgante salino. Realizar lavado gástrico, cuidando de evitar la aspiración.

Teléfonos de Emergencia: CITUC: (56-2)26353800
Cheminova Chile Limitada: (56-2) 28204200

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

Almacenar en envases originales debidamente cerrados y etiquetados, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, separado de cualquier tipo de alimento o bebida. Almacenar en un lugar cerrado bajo llave.

NOTA AL COMPRADOR: Como la aplicación práctica y una serie de otros factores que influyen en el éxito del empleo del producto escapan totalmente a nuestro control, no podemos dar garantía alguna respecto de los resultados que se obtengan de su uso. Por consiguiente, los riesgos son de responsabilidad del usuario, cualquiera que fuese el método de aplicación que se emplee, garantizamos la calidad óptima e invariable y el porcentaje de contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo.

23.04.18

CAPTURE 10 EC

INSECTICIDA ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

CAPTURE 10 EC es un insecticida-acaricida para control de una amplia gama de insectos masticadores y chupadores, en cultivos según detalle en tabla de instrucciones de uso.

Composición

Bifentrina *	10% p/v (100 g/L)
Coformulantes, c.s.p	100 % p/v (1 l)

*Bifentrina es una mezcla racémica del par enantiomérico:
(Z)-(1R)- cis y (Z)-(1S)-cis- bifentrina: (1RS, 3RS)-(Z)-3-(2-cloro-3,3,3- trifluoroprop-1-enil)-2,2 dimetilcicloropropanocarboxilato de 2-metil-bifenil-3-ilmetilo.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.666

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:
Lote No.:
Fecha de venc.:

Fabricado por:
FMC Corporation
1735 Market Street filadelfia,
Estados Unidos

FMC Quimica do Brasil Ltda.
Avda. José Bonifacio Coutinho
Nogueira, 150. Campinas-Brasil

Importado y Distribuido por:
Cheminova Chile Limitada
Av. Vitacura 2670 of. 1501
Las Condes, Santiago-Chile

INSTRUCCIONES DE USO

CAPTURE 10 EC es un insecticida-acaricida, tóxico por contacto y por ingestión, recomendado para usos a continuación detallados.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Remolacha, Papa	Larvas minadoras (*Liriomyza sativa), (Liriomyza huidobrensis*)	125 cc/ha	Época de aplicación: aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Número máximo de aplicaciones: 2 Frecuencia: 7 días. Mojamiento: 200 a 400 L/ha.
	Langostinos (*Paratanus exitiosus*) y Pulgones *(Myzus persicae*).	75 cc/ha	
Empastadas: Chépica, Pasto miel, Pasto dulce,Ballicas, Trébol enano y Trébol blanco	Cuncunilla negra (*Dalaca spp.*)	100-125 cc/ha	Época de aplicación: aplicar a la base de la planta, cuando aparezcan los primeros insectos. Aplicar dosis mayor para alta presión de la plaga. Número máximo de aplicaciones: 2 Frecuencia: realizar la segunda aplicación cuando aparezcan nuevos ejemplares de la plaga. Mojamiento: mínimo 200 L/ha
Parronales y Viñas	Trips Californiano (*Frankliniella occidentalis*).	60 cc/100 L de agua	Al observar los primeros ejemplares. Usar dosis mayores con poblaciones altas de insectos. Iniciar con brote expuesto y presencia de arañita, en caso de alta presión, repetir a los 15 días. Mojando tanto los brotes como los brazos. Mojamiento mínimo viñas 700 L/ha
	Eulia de los frutales (*Proeulia auraria*).	20-30 cc/100 litros de agua	
	Falsa arañita de la vid (*Brevipalpus chilensis*).	(**) 30 cc/100 L de agua	
Clementinas	Falsa arañita de la vid (*Brevipalpus chilensis*).	50 cc/100 litros de agua	Aplicar al observar los primeros ejemplares, Utilizar un alto volumen de agua de manera de mojar el interior del árbol. Mojamiento: 1500 L/ha
Paltos	Arañita Roja del palto (*Oligonychus yothersi*)	50 cc/100 litros de agua	Aplicar al observar los primeros ejemplares, Utilizar un alto volumen de agua de manera de mojar el interior del árbol. Mojamiento: 3000 L/ha.
Almendro, Cerezos, Ciruelos, Damascos Durazneros,Nectarinos	Polilla Oriental (Cydia molesta)	8-12 cc/100 litros de agua (**)	Cuando lo indiquen las trampas o al aparecer los primeros ejemplares Mojamiento: 1500 L/ha.
	Eulia de los frutales (*Proeulia auraria*) Pulgon verde (*Myzus persicae*)	12-15 cc/100 lits de agua (**)	Al aparecer los primeros ejemplares, detectados según monitoreo. Mojamiento 1500 L/ha
	Trips californiano (*Frankliniella occidentalis*)	20-25 cc/100 litros de agua (**)	
Manzanos, Perales, Membrillos, Perales Asiáticos.	Polilla de la manzana (Cydia pomonella). Eulia de los frutales (Proeulia auraria).	8-12 cc/100 litros (**)	Cuando lo indiquen las trampas. Mojamiento: 2000 L/ha
	Arañita Roja Europea (Panonychus ulmi). Arañita bimaculada (Tetranychus urticae).	30 cc /100 litros de agua	Al observar los primeros ejemplares. Mojamiento: 2000 L/ha.

NOCIVO

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Frambuesas, Arándanos, Frutillas.	Arañita Roja Europea (Panonychus ulmi), Arañita bimaculada (Tetranychus urticae), Burrito (Naupactus xanthographus).	300 cc/ha	Al observar los primeros ejemplares. Mojamiento: 400 L/ha.
	Trips Californiano (Frankliniella occidentalis)	60 cc/100 litros de agua	
Rosas, Claveles	Mosquita Blanca (Trialeurodes vaporariorum).	300-500 cc/ha (**)	Al aparecer los primeros ejemplares. Dosis según presión de plaga. Mojamiento: 200 L/ha.
	Arañita Roja Europea (Panonychus ulmi), Arañita bimaculada (Tetranychus urticae), Falsa Arañita de la vid (Brevipalpus chilensis).	200-300 cc/ha (**)	
	Trips californiano (Frankliniella occidentalis).	60 cc/100 L de agua	
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta*)	100 cc/ha	Proteger el fruto desde tamaño de 1 cm Mojamiento: 200 L/ha.
Porotos, Arvejas, Habas, Lentejas, Garbanzos.	Polilla del frejol (Epinotia aporema)	100 cc/ha	Proteger las vainas desde cuaja. Cuando los brotes se vean dañados. Mojamiento: 200 L/ha
Maíz	Gusano del choclo (Heliothis zea).	120-180 c/ha	Época de aplicación: aplicar una vez, al inicio de la emisión de los estilos. Número máximo de aplicaciones: 1. Mojamiento: aplicar un volumen de hasta 300 L/ha. Época de aplicación: aplicar en pre siembra, siembra incorporado, o en post-emergencia a la base de la planta. Número máximo de aplicaciones: 1. Mojamiento: mínimo de 200 L/ha.
	Arañita bimaculada (Tetranychus urticae).	200-300 c/ha	
	Gusano cortador (Agrotis spp), gusano barrenador (Elasmopalpus spp.), Gusano Alambre (Conoderus rufangulus)	300 c/ha	

Aplicación Aérea

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Maíz	Gusano del choclo (Heliothis zea)	120-180 cc/ha	Cuando el estado de desarrollo del cultivo no permite el ingreso de maquinaria, aplique vía aérea, aplicar al aparecer los primeros ejemplares. Número máximo de aplicaciones: 1. Mojamiento: 60 L/ha. La dosis mayor se recomienda para alta presión de la plaga.
	Arañita bimaculada (Tetranychus urticae)	200-300 cc/ha	

(*) Número máximo de aplicaciones durante la temporada: 2, Frecuencia de aplicación: aplicar 7 días después de la primera aplicación, si se presenta re infestación de la plaga.
(**) Aplicar la dosis baja para las primeras apariciones de la plaga en niveles bajos de presión. Aplicar las dosis altas para niveles de poblaciones altas y ya establecidas
CAPTURE 10 EC ES TOXICO PARA ABEJAS NO APLICAR EN FLORACIÓN.
CAPTURE 10 EC se puede aplicar mediante equipos manuales o mecánicos debidamente calibrados o también en forma manual, tomándose las debidas precauciones.
Compatibilidad: es compatible con coadyuvantes como Bond. **Incompatibilidad:** No mezclar con productos alcalinos. **NO APLICAR MÁS DE DOS VECES EN EL CICLO DE CULTIVO.**
Tiempo de Reingreso (personas y animales): Se debe esperar un período de resguardo de 4 horas para reingresar al área tratada. Fitotoxicidad: CAPTURE MR 10 EC no es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.
Período de carencia (días): Parronales y Viñas: 15; Clementinas y Paltos: 21; Almendro, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Durazneros, Nectarinos, Manzanos, Perales, Membrillos y Perales Asiáticos: 10. Frambuesas, Arándanos y Frutillas: 2; Rosas y Claveles, no tienen. Tomate: 6; Porotos, Arvejas, Habas, Lentejas y Garbanzos: 3. Empastadas: no aplica. Maíz: 30. Remolacha y papa: no tienen.
Condiciones determinantes para la aplicación segura y eficaz: No aplicar con viento superior a 10 km/hora. No aplicar con temperaturas superiores a 30° C. No aplicar si se esperan lluvias en las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.