

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**Grupo Químico:** Fungicida biológico en base a esporas de la Cepa IAB/BS/03 de la bacteria *Bacillus subtilis*.

### Precauciones durante la manipulación:

Se recomiendan las siguientes medidas:

Se debe utilizar ropa y elementos de protección personal durante el manejo del producto.

**Durante la preparación de la mezcla** usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y máscara con filtro y antiparras. **Durante la aplicación** usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable y máscara con filtro y antiparras. No fume, coma o beba durante la manipulación y el uso de este producto. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica. Lavarse prolijamente con agua limpia antes de comer, beber, fumar o ir al baño, después del trabajo. Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el producto ni la neblina de pulverización.

### Recomendaciones en caso de intoxicación o accidente:

**Primeros auxilios: Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continuar con el enjuague. Además, las lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico si es necesario. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico. **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica. **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Síntomas:** Pueden presentarse síntomas de intoxicación no específicos como fatiga, malestar general, mareos, náuseas, entre otros.

Teléfono de urgencias toxicológicas (RITA): +56 2 2777 1994

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"**

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"**

**"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"**

**"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA."**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO HUMANO O ANIMAL. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO".**

**Riesgos medioambientales:** No es tóxico a organismos acuáticos, aves animales ni abejas.

**Almacenaje:** OSPO-Vi55 debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 10–25°C.

# OSPO-Vi55

## FUNGICIDA BIOLÓGICO POLVO MOJABLE (WP)

Ospos-Vi55 es un fungicida biológico con acción preventiva para el control de oidio en frutilla y uva.

Composición (p/p):

*Bacillus subtilis* cepa IAB/BS/03\* .....0,01% m/m (0,1 g/kg)

Coformulantes, c.s.p. 100% m/m (1 Kg)

\*Contienen mínimo 2,42x10<sup>9</sup>UFC/g

Autorización del servicio Agrícola y Ganadero N° 2.989

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTENIDO NETO: **1 kg**

MASA NETA: **XXX**

FECHA DE FABRICACIÓN: **XX/XX/20XX**

FECHA DE CADUCIDAD **XX/20XX**

LOTE: **XXXXXXXX**

Fabricado por:

Grupo Agrotecnología, S.L. (IBERFOL).

Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57

03300, Orihuela (España)

Tel. +34-966-738-232

Distribuido por:

MipAgro Ltda.

Tel. (72) 255-3696

www.mipagro.cl

REQUINOA

## CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

El modo de acción del ingrediente activo OSPO-Vi55 corresponde a fungistático y fungitóxico, la competencia natural por el espacio vital y los nutrientes.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutilla invernadero	Oidio ( <i>Sphaerotheca maculata</i> )	500 g/hL	Se recomienda un mínimo de seis aplicaciones, entre floración y cosecha, con un mojado de 600 L/h. Cuando las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de la enfermedad se recomiendan hasta doce aplicaciones.
Uva	Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> )	500 g/hL	Aplicar de forma preventiva. Se recomiendan hasta cinco aplicaciones, desde inicio de racimo a cosecha, con un mojado de 1500 L/h, para disminuir la incidencia y severidad de Oidio en vides.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque hasta 1/3 de su capacidad con agua. Agregar la cantidad de Ospos-Vi55 recomendada y completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

**Incompatibilidad:** No mezclar **OSPO-Vi55** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**Fitotoxicidad:** No se ha observado fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda.

**Tiempo de Reingreso para personas y animales:** 4 horas después de la aplicación.

**Periodo de carencia:** 0 días.

**Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz:** No aplicar con viento superior a 10 km/hora. No aplicar con temperaturas superior a 30°C. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar product preparado del día anterior.



# CUIDADO

