PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Metriphar® Max, pertenece al grupo químico de las Triazinonas
Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. La manipulación del producto sólo debe ser realizada por personas adultas y entrenadas en su manejo. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto
Equipo de protección personal: Durante la preparación usar delantal impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. Durante la aplicación usar de protección, traje impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras.
No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.
A la dosis de aplicación recomendada, **Metriphar® Max**, es moderadamente tóxico a aves, extremadamente tóxico a organismos acuáticos, y virtualmente no tóxico para abejas.
Realizar triple lavado de los envases, luego, disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipiado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No proceder a enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente. No reutilizar los envases.
Instrucciones para el triple lavado.
Vaciar el contenido del envase por 30 segundos. Agregue agua al envase hasta un cuarto de su capacidad y agitar durante 30 segundos. Vierta en la máquina y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Repita esta operación tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente.
Síntomas de Intoxicación: Si se inhala, puede causar irritación del tracto respiratorio. Por contacto dermal, puede causar irritación o quemaduras. Si existe absorción a través de la piel, puede producir irritación. Por contacto ocular, puede causar Irritación y dolor.
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. Para descontaminación gastrointestinal, puede usarse carbón activado añadiéndole el catártico sorbitol a la suspensión de carbón.
Primeros auxilios:
En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
En caso de contacto con la piel: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.
En caso de inhalación: traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Lleve la etiqueta o el envase del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de intoxicación llamar:
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Arysta Lifescience /UPL : 56 2 2560 4500 - 56 2 2560 4530

v24082020

METRIPHAR® MAX

Herbicida
Suspensión Concentrada (SC)

Metriphar® Max es un herbicida suelo activo sistémico y selectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en papas, tomates, espárragos, lupino y alfalfa según lo que se indica en el cuadro de Usos y Dosis.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo:	**% p/v**
Metribuzina*	48.0 % (480 g/L)
Coformulantes c.s.p	100.0 % (1 L)

* 4-amino-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3675

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L. Fecha Venc.:

Formulado por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

Distribuido por:

UPL OpenAg™

Arysta Lifescience Chile S.A. una empresa UPL
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
https://www.upl-ltd.com/cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Metriphar® Max es un herbicida suelo activo sistémico y selectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en papas, tomates, espárragos, lupino y alfalfa según lo que se indica en el cuadro de Usos y Dosis.
Equipo de aplicación: Utilizar equipos sólo para tratamiento de herbicidas.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Malezas controladas	Dosis L/ha (*)	Momento de aplicación
Papas	**Malezas de Hoja Ancha:** Alfilerillo *(Erodium cicutarium)*, Bledo *(Amaranthus retroflexus)*, Bolsita del pastor *(Capsella bursa-pastoris)*, Calabacillo *(Silene gallica)*, Chamico *(Datura stramonium)*, Diente de león *(Taraxacu officinale)*, Duraznillo *(Polygonum persicaria)*, Enredadera anual *(Polygonum convolvulus)*, Gallito *(Xanthosoma hoifmannii)*, Hierba de la Culebra *(Fumaria agraria)*, Manzanilla *(Matricaria chamomilla)*, Manzanilla Hedionda *(Anthemis cotula)*, Mostacillas *(Sisymbrium officinale)*, Nilhue *(Sonchus sp.)*, Ortiga *(Urtica urens, Urtica dioica)*, Pasto Pinito *(Spergula arvensis)*, Pensamiento *(Viola tricolor)*, Pichoga *(Euphorbia helioscopia)*, Porotillo *(Elytropus chilensis)*, Quilloi-quilloi *(Stellaria media)*, Quingüilla *(Chenopodium album)*, Rábano *(Raphanus raphanistrum)*, Sanguinaria *(Polygonum aviculare)*, Senecio *(Senecio vulgaris)*, Siete Venas *(Plantago lanceolata)*, Verdolaga *(Portulaca oleracea)*, Verónica *(Veronica arvensis)*, Viola *(Viola arvensis)*, Yuyo *(Brassica napus)*.	0,5 - 0,75	Tratamiento Pre-emergencia. Debe ser aplicado después de la aporca y antes de la emergencia del cultivo, en suelo liviano (suelo arenoso) o de bajo contenido de materia orgánica o arcilla. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 150 - 200 L agua/ha.
		1,0 - 1,5	Tratamiento Pre-emergencia. Debe ser aplicado después de la aporca y antes de la emergencia del cultivo, en suelos pesados, con alto contenido de materia orgánica o arcilla. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 150 - 200 L agua/ha.
		0,5 - 0,75	Tratamiento Post-emergencia. Con malezas de hasta 2,5 cm de altura y con plantas de papa de no más de 10 cm. No usar el tratamiento post- emergencia en papa de piel blanca. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 200 - 400 L agua/ha.
Tomate (pre y post transplante)*		1,0 - 1,4	Tratamiento Pre-trasplante. Realice la aplicación una semana antes del trasplante e incorpore a 5 cm de profundidad con el rastraje o con el riego. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento 150 - 300 L agua/ha.
		0,6 - 1,0	Tratamiento Post-trasplante. Aplique cuando el cultivo este establecido. Esto es aproximadamente, en plantas provenientes de almaciguera, 15 y 20 días después del trasplante, y en plantas a raíz desnuda, entre 20 y 25 días luego del trasplante. No aplicar en mezcla ni aplicar otro producto dentro de las 24 horas siguientes de aplicado este herbicida. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento 300 L agua/ha.
Tomate (siembra directa)		0,6 - 1,0	Siembra directa: Post-emergencia: aplique cuando las plantas tengan 4 – 6 hojas. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 200 – 400 L agua/ha.
Espárragos		1,4 - 2,0	En espárragos verdes, aplicar sobre suelo bien mullido, luego de cortada la parte aérea y 30 días antes de la emergencia de los turiones. Para espárragos blancos, aplicar luego de la aporca y 15 días antes de la emergencia de los turiones. Mojamiento: 150 - 300 L agua/ha.
Alfalfa establecida	**Malezas gramíneas:** Ballica *(Lollium sp.)*, Bromo *(Bromus tectorum)*, Hualcacho *(Echinochloa sp.)*, Maicillo de semilla *(Sorghum halepense)*, Pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)*, Piojillo *(Poa Annua)*, Pega-pega *(Setaria verticillata)*.	0,8 - 2,2	Aplicar con el cultivo establecido y en época de dormancia, otoño-invierno. Para suelos con bajo contenido de materia orgánica, menor a 2%, no aplicar más de 1,5 L/ha. Para suelos con más de un 2% de materia orgánica, aplicar al menos, 1,0 L/ha. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento 200 - 400 L agua/ha. Si hay malezas en activo crecimiento, usar los mayores volúmenes de agua.
Lupino		1,0 - 1,5	Tratamiento de Pre-emergencia del cultivo. Aplique con buena humedad del suelo e inmediatamente después de la siembra. Nº aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 150 – 200 L agua/ha.

*En tomate de trasplante se debe realizar solamente una aplicación durante la temporada, eligiendo uno de los tratamientos del cuadro.

NOTA: Metriphar® Max requiere suelo húmedo para activarse, es por esto que los mejores resultados se obtienen cuando se aplica con pronóstico de lluvias o riego hasta dos semanas después de su aplicación.

Preparación de la mezcla: llene con agua hasta la mitad el estanque del equipo aplicador y agregue la cantidad recomendada de **Metriphar® Max**, luego complete hasta el volumen deseado, manteniendo la agitación constante.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso indicadas en esta etiqueta y cuando las condiciones del cultivo son las óptimas. En ciertas variedades de papas de piel blanca sólo debe aplicarse en pre-emergencia de las malezas, en post-emergencia verificar tolerancia varietal. No aplicar en cultivos bajo invernadero. En tomate, cuando la tasa de crecimiento ha sido baja, puede llegar a existir cierto grado de fitotoxicidad en post-emergencia. Así mismo las variedades de tomates precoces pueden ser más sensibles al herbicida. No aplicar en suelos arenosos. Pueden presentarse daños por fitotoxicidad si se aplica después de períodos de hasta 3 días de tiempo frío, húmedo o nublado. Se recomienda volver a plantar o sembrar otros cultivos 4 meses posteriores a su aplicación.

Compatibilidad: Metriphar® Max usualmente se aplica solo. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la mezcla.

Incompatibilidad: Metriphar® Max es incompatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la mezcla.

Período de Carencias: Tomate: 20 días; Alfalfa y Lupino: 51 días; Papas y Espárragos: 60 días.

Tiempo de Reingreso al área tratada: como resguardo para el ingreso de personas y animales, no ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación. Previamente, verificar que la aspersión se haya secado sobre la superficie de los cultivos tratados.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las malezas para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

® Es marca Registrada.

USO EXCLUSIVO AG

NOCIVO