

EXILIS®

FITORREGULADOR
CONCENTRADO SOLUBLE SL

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero Nº 4.234

EXILIS® Fitoregulador para raleo y aumento de tamaño de frutos.

Composición:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 6-benciladenina | 2,12 % p/v (21, 2 g/L) |
| Coformulantes c.s.p. | 100 % p/v (1 L) |

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Nº Lote:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 1 litro

NO INFLAMABLE-NO EXPLOSIVO-NO CORROSIVO

Fabricado por:

FINE AMERICAS, Inc.

1850 Mount Diablo Blvd., Suite 405, Walnut Creek,
CA 94596, Estados Unidos.

FINE AGROCHEMICALS LTD.

Hill End House, Whittington, Worcester
WR5 2RQ Reino Unido.

Importado y Distribuido por:

AGROCONNEXION SPA.

Av. Kennedy 5749 of 3702, Las Condes.
Santiago de Chile.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUÍMICO: 6-benciladenina pertenece al grupo químico de las citoquininas. Usar ropa protectora, durante la preparación del concentrado usar guantes impermeables y botas de goma, protector facial y overol impermeable. Durante la aplicación usar guantes y botas de goma, protector facial y overol impermeable. No permitir que personas alérgicas manipulen el producto. Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir el producto. Después de la aplicación, lavarse bien con agua y lavar la ropa utilizada. Prevenir la contaminación de alimentos y utensilios de comida. No reutilizar los envases vacíos para ningún propósito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen síntomas de intoxicación. Puede causar irritación de piel y ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: **En caso de inhalación:** llevar a la persona a áreas ventiladas. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Proporcione asistencia médica. **En caso de contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Proporcione asistencia médica. **En caso de contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Proporcione asistencia médica. **En caso de ingestión:** no inducir el vómito, beber agua y acudir al servicio de salud más cercano. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Efectuar tratamiento sintomático.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Efectuar tratamiento sintomático. Consultar inmediatamente al médico.

ANTÍDOTO: EXILIS® no tiene antídoto específico.

ADVERTENCIA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: No es tóxico para peces, abejas, aves ni otros organismos vivos.

PRECAUCIÓN DE ALMACENAJE: Almacenar en un lugar fresco y seco, herméticamente cerrado en el envase original, lejos de alimentos, semillas, fertilizantes u otros productos agrícolas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO LAVAR LOS ENVASES EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

Para realizar el triple lavado se debe llenar el envase hasta un cuarto de su capacidad, cerrarlo y agitar durante 30 seg. Posteriormente verter el contenido en el estanque del pulverizador manteniendo en posición de descarga durante 30 seg. Repetir este procedimiento tres veces. Luego perforar el envase para evitar su reutilización. Retirar la tapa y guardar en un lugar seguro en espera de su traslado al centro de acopio.

AVISO DE GARANTÍA: Los fabricantes garantizan el contenido de los envases herméticamente cerrados. Sin embargo su manejo, transporte almacenamiento y uso escapa a nuestro control, por lo que no damos garantía tácita o implícita.

Fono Emergencia Agroconnexion SpA: 2 22025944 de 9 a 18:15 hrs. **Fono RITA:** 2 27771994.



CUIDADO



EXILIS®

FITORREGULADOR
CONCENTRADO SOLUBLE SL

INSTRUCCIONES DE USO

EXILIS® es un agente raleador de post floración en manzanos y perales. EXILIS® también puede ser usado como promotor del crecimiento de frutos en manzanos, olivos, paltos, uva de mesa (variedad Red Globe y Crimson Seedless) y cítricos (mandarinos, clementinos, naranjos y limoneros).

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

| Cultivo | Objetivo | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| Manzanos Perales | Raleo | 6,0 12,0 | Realizar 1 o 2 aplicaciones cada 7-10 días en fruto rey de 5 a 15 mm de diámetro. Usar 1.200 L/ha de mojamiento. |
| Manzanos | Aumento de tamaño de frutos | 0,6 - 3,0 | Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 3-10 días. Aplicar desde caída de pétalos con 1.200 L/ha de mojamiento. |
| Olivos | Promotor de crecimiento | 1,5 - 2,3 | Aplicar cuando las panículas están en su fase de expansión con inicio de floración. Utilizar la dosis menor en casos de baja floración y la mayor en casos de floración alta. Aplicar con mojamiento de 1000 L/agua/ha. Realizar máximo 1 aplicación por temporada. |
| Paltos | Promotor de crecimiento | 1,9 | Aplicar en periodo de pre-floración cuando las panículas están en pleno desarrollo (10% de las panículas más adelantadas presenten un brote vegetativo no mayor a 5 cm). Aplicar con un mojamiento de 2.000 L agua/ha. Realizar máximo 1 aplicación por temporada. |
| Uvas (Red Globe y Crimson seedless) | Promotor de crecimiento | 340 cc/ha en cada aplicación | Aplicar cuando el 100% de los racimos, estén con la cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 12-14 ó 18 -20 mm), (Crimson seedless 6-8 mmy 10-12 mm). La aplicación debe ser dirigida a los racimos con un mojamiento de 600 L agua/ha. Con electrostática usar 100 L agua/ ha. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada cada 7 días. |
| Cítricos (Mandarinos, Clementinos, Naranjos y Limoneros) | Aumento de tamaño de frutos | 2,0 | Realizar 3 aplicaciones en la temporada: botón floral, plena flor y en cuaja e inicios de crecimiento de fruta. Aplicar con un mojamiento de 1.500 – 2.000 L/ha. |

APLICACIÓN

La intensidad de la respuesta a la aplicación para raleo depende del estado de desarrollo de los frutos, condición fisiológica del árbol, variedad y condiciones climáticas, como temperaturas extremas anteriores o posteriores a la aplicación (<7°C ó >32°C). Para raleo en árboles estresados por enfermedad o estrés fisiológico se recomienda usar las dosis bajas. Retrasar la aplicación en caso de lluvia hasta que el follaje no muestre gotas visibles. Lluvias 6 horas después de la aplicación para raleo pueden reducir los efectos esperados. En la aplicación para raleo dirigir el 80% de la pulverización a las 2/3 partes superiores del árbol. Los resultados de EXILIS® mejoran si es aplicado por la mañana o por la tarde para asegurar un secado lento. Puede ser aplicado con máquina pulverizadora convencional. Asegurar un mojamiento completo del follaje y los frutos. El volumen de agua para la aplicación deberá ser ajustado según densidad de plantación y tamaño de los árboles.

INSTRUCCIONES PARA HACER LA MEZCLA

Para mejorar la actividad de EXILIS® se recomienda bajar el pH de la mezcla para aplicación a pH 5,0 - 6,5 mediante el uso de un acidificante. Además es posible agregar un tensioactivo a la mezcla para obtener un mejor resultado. Se sugiere el uso de Indicate-5® para lograr un efecto acidificante, buffer y tensioactivo.

INCOMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros agroquímicos.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con tensioactivos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico cuando se usa según las dosis y formas de aplicación recomendadas.

PERÍODO DE CARENCIA

No tiene. EXILIS® es un raleador para ser usado dentro de los 30 primeros días después de flor.

TIEMPO DE REINGRESO

Las personas pueden reingresar después de 12 horas, una vez que en el área tratada la aplicación se haya secado. No tiene restricciones para el reingreso de animales.



CUIDADO

