


## *Avetianella longoi* Siscaro

(Hymenoptera: Encyrtidae)

<b>Organismo asociado</b>	<i>Phoracantha</i> spp. (Col.: Cerambycidae).	 <p>a) Foto: M.Peralta @ SAG</p>	<p style="text-align: center;"><b>Distribución</b></p> <p>Este parasitoide de origen australiano, está presente en Chile entre las regiones de Atacama y La Araucanía.</p>
<b>Estado de desarrollo del hospedero</b>	Huevos de <i>Phoracantha semipunctata</i> y <i>Phorachanta recurva</i> .		
<b>Observaciones</b>	<p>Es un parasitoide interno, solitario y específico de escarabajos del género <i>Phoracantha</i>.</p> <p>El huevo parasitado se oscurece cuando se forma la pupa del parasitoide en su interior.</p>	 <p>b) Foto: M.Peralta @ SAG</p>	 <p>Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región de O'Higgins Región del Maule Región del Bío Bío Región de La Araucanía</p> <p>Región Metropolitana</p> <p><b>Leyenda</b> Eucalipto Región</p> <p>150 75 0 150 Kilómetros</p>

a) Adulto de *Avetianella longoi* Siscaro, b) Estados inmaduros al interior de huevos de *Phoracantha* sp.