




Pauesia juniperorum (Stary)

(Hymenoptera: Braconidae)

Organismo asociado	<i>Cinara cupressi</i> (Buckton) (Hem.: Aphididae).	 <p>a) Foto: E. Rojas @ SAG</p>	<p>Distribución:</p> <p>Este parasitoide de origen europeo, está presente en Chile entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes.</p>
Estado de desarrollo del hospedero	Ninfas de <i>Cinara cupressi</i> .	 <p>b) Foto: L.Jaques @ SAG</p>	 <p>Región de Arica y Parinacota Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región de O'Higgins Región del Maule Región Metropolitana Región del Bio Bio Región de Los Ríos Región de La Araucanía Región de Los Lagos Región de Aysén Región de Magallanes</p> <p>Leyenda Región</p> <p>500 250 0 500 Kilómetros</p>
Observaciones	<p>Es un parasitoide interno, solitario y específico del género <i>Cinara</i>. El adulto se alimenta internamente de la ninfa y emerge realizando un orificio en el exoesqueleto del insecto. El adulto mide menos de 2.5 mm de longitud.</p>	<p>a) Adultos de <i>Pauesia juniperorum</i>, b) Momia de <i>Cinara cupressi</i> con orificio de emergencia de <i>Pauesia juniperorum</i>.</p>	