


Coccygomimus fuscipes (Brullé, 1846)

(Hymenoptera: Ichneumonidae)

<p>Organismo asociado</p>	<p><i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Tortricidae) (Polilla del brote del pino). <i>Ormiscodes amphimone</i> (Fabricius) (Lep.: Saturniidae).</p>	 <p>Adulto de <i>Coccygomimus fuscipes</i> (Fotografía: M. Gonzalez. SAG)</p>	<p>Distribución:</p> <p>Región de Coquimbo a Magallanes.</p>
<p>Estado desarrollo Hospedero</p>	<p>Pupa.</p>		 <p>Map showing distribution of <i>Coccygomimus fuscipes</i> across Chile. The distribution is indicated by a shaded area along the coast from the Coquimbo region down to the Magallanes region. The map includes labels for various regions: Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región de O'Higgins, Región del Maule, Región del Bío Bío, Región de La Araucanía, Región de Los Ríos, Región de Los Lagos, Región de Aysén, and Región de Magallanes. A legend indicates 'Región' and a scale bar shows 310, 155, 0, 310 Kilómetros.</p>
<p>Observaciones</p>	<p>Endoparasitoide nativo asociado a pupas de varias familias del orden Lepidoptera.</p>		