

INSIGNIA® 70 WP

FUNGICIDA
POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.929

INSIGNIA® 70 WP es un fungicida que actúa por contacto y de manera preventiva. Está recomendado para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso, en cebolla, tomate y papa.

COMPOSICIÓN:

Propineb *	70,0 % p/p (700 g/kg)
Cofomulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)

* Propilenbis(ditiocarbamato) cínquico polimérico

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha de vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPANA - CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou County

ZHEJIANG, CHINA

ZIP: 324400

COROMANDEL INTERNACIONAL LIMITED

Unidad 1: Plot N° 2102, GIDC, Sarigam-396 155, Dist.: Valsad, GUJARAT, INDIA

Unidad 2: Plot N° Z/103 /G, Industrial Estate Dahej, SEZ II, Dahej-392 130, Taluka-Vagra,

Dist. Bharuch, GUJARAT, INDIA

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

INSIGNIA® 70 WP, es un fungicida, cuyo ingrediente activo Propineb pertenece al grupo químico de los Alquilenbis (ditiocarbamatos). Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del polvo mojable usar delantal impermeable, antiparras, guantes impermeables, máscara con filtro y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: INSIGNIA® 70 WP, es moderadamente tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos, ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y prácticamente no tóxico para abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No se dispone de antídotos específicos.

Primeros auxilios: **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Para todos los casos,** traslade al paciente al hospital más cercano, llevando en lo posible la etiqueta o el envase del producto. **Síntomas de intoxicación:** Irritaciones oculares de leves o moderadas, constipación por obstrucción intestinal, irritación de las vías respiratorias, tos, rinitis, dificultad respiratoria y posibles vómitos.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA) (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **INSIGNIA® 70 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

INSIGNIA® 70 WP es un fungicida que actúa por contacto y de manera preventiva. Está recomendado para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso, en cebolla, tomate y papa.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Cebolla	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	2,0 – 2,5 (500 – 600 g/100 L de agua)	Aplicar de manera preventiva, de preferencia a inicio de temporada, con intervalos de 7 a 10 días. Dosificar por concentración durante el desarrollo del cultivo y en dosis por hectárea cuando el cultivo se encuentre en pleno desarrollo. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha	9
Tomate	Podredumbre mohosa de los frutos. (<i>Alternaria alternata</i>)			2
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)			2

Instrucciones de Uso:

- Para todos los cultivos realizar como máximo 3 aplicaciones por temporada.
- Utilizar dosis mayor cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 28 °C).
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla:

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **INSIGNIA® 70 WP** y luego completar con agua hasta el volumen final necesario, manteniendo agitación constante.
Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad:

INSIGNIA® 70 WP es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.
En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Fitotoxicidad:

INSIGNIA® 70 WP no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso:

Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.

De acuerdo a la clasificación FRAC **Propineb (INSIGNIA® 70 WP)** pertenece al grupo M3, con actividad de contacto multi-sitio. Pertenece al Grupo de los Ditiocarbamatos. Su riesgo de resistencia es considerado bajo.

Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o cambios en la sensibilidad a fungicidas. Esto puede ocurrir a través de una variación genética normal en cualquier población de hongos fitopatógenos y llegar a afectar a **INSIGNIA® 70 WP** como a otros productos de su mismo grupo químico. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de fungicidas y la población será de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **INSIGNIA® 70 WP**, por lo que Anasac no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, se sugiere consultar a nuestro Departamento Técnico o a algún especialista.



CUIDADO

