

INSTRUCCIONES DE USO

KAZARO® 276 SL, es un herbicida de contacto no selectivo.

Cuadro de instrucciones de uso:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES	Carencia (Días)
Almendra, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Peral, Vid, Kiwi, Limonero, Clementina Lima, Naranja, Pomelo, Mandarino, Tangerina, Tangelo, Níspero, Caqui, Chirimoyo, Granado, Higo, Avellano, Castaño, Papayo, Paito, Pecano, Pistacho, Mango, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarpaparrilla, Frutilla	Malezas gramíneas anuales: Ballica, Avenilla, Poa o Plojillo, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pegá, Pasto del perro, Bromo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia, Cola de ratón	1,5-3,0 o 0,75-1,0% (0,75-1,0 L/100 L de agua)	Aplicar con maleza nueva y en activo crecimiento (3-15 cm de altura). Aplicar sobre las malezas, hasta 5 veces en la temporada, alternando con productos de diferente modo de acción, cuidando estrictamente no aplicar sobre corteza inmadura o partes verdes de las plantas. En huertos jóvenes aplicar con campana protectora de boquillas, mientras la corteza del árbol esté inmadura.	N.C
Cero y mínima labranza: Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Arroz, Arveja, Haba, Fréjol, Garbanzo, Lenteja, Espárrago, Papa, Remolacha, Soya, maravilla, Tabaco, Betarraga, Ajo, Cebolla, Melón, Zapallo, Zanahoria	Malezas gramíneas perennes: Chépica o Pasto quila, Pasto cebolla, Maicillo, Chépica gigante, Pasto bermuda.	1,5-3,0	Aplicar a toda la superficie o en banda, con maleza emergida (3-15 cm de altura) durante o después de la siembra o plantación, pero antes de la emergencia o establecimiento del cultivo.	N.C
Maíz, Arveja, Haba, Fréjol, Lenteja, espárrago, Papa, Tabaco, Betarraga, Ajo, Cebolla, Brócoli, Repollo, Coliflor, Alcachofa, Frutilla	Malezas hoja ancha anuales: Bledo, Amor seco, Bolsita del pastor, Cardo, Romanza, Chamico, Hierba cana, Senecio, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quingüilla, Rábano, Sanguinaria, Verdolaga, Vinagrillo, Quillo y quillo, verónica.	1,5-3,0	Aplicación selectiva entre hileras, evitando mojar el cultivo. En maíz cuando tenga unos 40 cm de altura. Aplicar en presiembra o preemergencia de cultivos sobre las malezas presentes. Aplicar antes de realizar la siembra o antes de la emergencia del cultivo. No aplicar con el cultivo presente. Aplicar 1 vez en la temporada.	N.C.
Pepino, Pimiento, Poroto Verde, Tomate, Tríticale, Sorgo		1,5-4,0	Aplicación selectiva sobre la maleza entre hileras, evitando mojar el cultivo.	N.C.
Remolacha		1,5-3,0	Aplicar en latencia invernal o inmediatamente después de un corte, desde el segundo año del cultivo en adelante.	N.C.
Alfalfa		2,0-3,0	Aplicación de limpieza y renovación de la pradera. Aplicar con malezas en crecimiento activo de 3-15 cm de altura.	N.C.
Regeneración de empastadas	Malezas perennes: Falso té, Achicoria, Siete venas, Hierba azul, Galega, Junquillo, Chufa o Coquillo, Correhuela, Malva, Zarzamora.	1,5-3,0	Para facilitar la cosecha se recomienda aplicar unos 2-3 semanas antes y con humedad de grano hasta un 35%	21

N.C.: NO CORRESPONDE POR MOMENTO DE APLICACIÓN.

Instrucciones de uso:

- **KAZARO® 276 SL** normalmente no controla los órganos de reproducción vegetativa bajo el suelo de malezas perennes, porque no se transloca; es herbicida de contacto.
- En las entrehileras de frutales y vides aplicar de preferencia con malezas en estado de mayor susceptibilidad o cuando tengan menos de 10 cm de altura, evitando el contacto del producto con el follaje verde del cultivo o troncos con madera inmadura (no lignificada).
- En las aplicaciones de **KAZARO® 276 SL** utilizar volúmenes de 200-300 L de agua/ha, de manera de mojar completamente las malezas.
- No utilizar **KAZARO® 276 SL** en cultivos o frutales nuevos que pueden ser mojados por la aspersión.
- No aplicar en días de viento o brisa, de velocidad mayor a 5 m/seg., en que la deriva puede dañar al cultivo o cultivos vecinos susceptibles.
- No utilizar **KAZARO® 276 SL** en maleza seca o de excesivo crecimiento.
- Realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada.
- Aplicar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo o con baja infestación y dosis mayor con malezas de mayor tamaño y alta infestación.

Preparación de la mezcla: Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **KAZARO® 276 SL**, y completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: **KAZARO® 276 SL** es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común. Se puede mezclar con SIMAZINA 90 WG y TANGO 24 EC. Para complementar la acción se puede mezclar con ARCO 2,4-D 480 SL y herbicidas residuales. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Incompatibilidad: **KAZARO® 276 SL** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: Causa fitotoxicidad en los cultivos cuyo follaje entra en contacto con **KAZARO® 276 SL**. Se trata de un herbicida de contacto no selectivo.

Tiempo de reingreso: Impedir durante 24 horas el ingreso al sector tratado sin equipo de protección. En el caso de animales esperar 48 horas para permitir el ingreso.

Clasificación HRAC: Grupo D22 Inhibidores del fotosistema I.



NOCIVO