

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Metribuzina pertenece al grupo químico de la 1,2,4-triazinona. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. Para manipular, usar guantes de goma, protector facial, delantal impermeable y botas de goma. Para Aplicar, usar guantes de goma, protector facial, delantal impermeable y botas de goma. Impedir el contacto del producto con la piel. No se debe comer, beber ni fumar durante la utilización del plaguicida. Evitar inhalaciones y contacto con ojos, nariz y boca. Evitar que el acarreo al preparar o aplicar el producto contamine otros cultivos, alimentos, aguas de lagos, lagunas, ríos u otros cursos de agua. Evitar contaminar insecticidas o fungicidas de uso agrícola. Debe efectuarse un aseo personal después del uso del producto y antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

**Riesgo ambiental:** Tóxico para aves, abejas, peces y microcrustáceos acuáticos.

**Síntomas de intoxicación:** Malestar general, dermatitis, espasmos musculares, congestión pulmonar.

**Primeros Auxilios:** Llamar al médico o trasladar al paciente al hospital más cercano y mostrar esta etiqueta al facultativo. **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco, permitir que repose bien abrigado. Llamar al médico. Si no respira, dar respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, dar oxígeno. **Ingestión:** No inducir el vómito a menos que se cuente con asesoría de personal médico. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Soltar ropas ajustadas como collares, corbatas o cinturones. Si aparecen síntomas, conseguir ayuda médica inmediatamente. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si se presenta irritación, conseguir ayuda médica. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consequir ayuda médica.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Tratamiento sintomático y de sostén.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN.**

**Almacenaje:** Conservar y comercializar este producto sólo en sus envases originales. Transportar y guardar este envase bien cerrado, bajo llave, en recinto que no reciba sol ni humedad.

**Triple lavado de los envases:** Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

**En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hr., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.**

# METRIPHAR® 480 SC

## HERBICIDA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Lote de fabricación : Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.445  
Fecha Vencimiento :

Herbicida sistémico selectivo, que controla a través de hojas y raíces, malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos hortícolas, como se describe en el cuadro de Instrucciones de Uso.

#### COMPOSICION:

Metribuzina\*..... 48% p/v (480 g/L)  
Coformulantes c.s.p..... 100% p/v (1 L)

\* 4-amino-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**CONTENIDO NETO: 1 LITRO**

Importa y Distribuye:  
**ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.**  
El Rosal 4610, Huechuraba,  
Santiago, Chile.  
ET3445-V002-01  
0S2

Fabricado por:  
**Arysta LifeScience Benelux SPRL.**  
Rue de Renoy, 26  
4102 Ougrée - Bélgica.

## INSTRUCCIONES DE USO

Herbicida sistémico selectivo que controla a través de hojas y raíces, malezas de hoja ancha (rábano, yuyo, chamico, quingüilla, verdolaga) y malezas gramíneas (pata de gallina, hualcacho, piojillo, ballica). Usado en cultivos de tomates, papas, espárragos y cultivos de lupino.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Papas Norte y Centro	<b>Malezas de hoja ancha:</b> Rábano ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	0,6 - 0,7	Aplicar de post-emergencia con plantas de hasta 10 a 15 cm de altura y malezas comenzando a emerger. Se puede aplicar también en pre-emergencia, aporcando previamente.
Papas Sur	Yuyo ( <i>Brassica campestris</i> )	1,1 - 1,5	Aplicar desde que se insinúe la emergencia hasta que las plantitas tengan 10 cm de altura.
Tomates (transplante)	Chamico ( <i>Datura stramonium</i> ) Quinuilla ( <i>Chenopodium sp</i> )	0,6 - 1,4	Aplicar 20 a 25 días después del transplante con plantita bien arraigada, al comenzar a emerger las malezas.
Espárragos (en producción)	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) <b>Malezas gramíneas:</b>	1,4 - 2,0	En espárrago blanco con camellones, antes de la emergencia de los turiones. En espárrago verde sobre suelo bien mullido antes de emergencia de turiones.
Lupino	Pata de gallina ( <i>Digitaria spp.</i> ) Hualcacho ( <i>Echinocloa crus-galli</i> ) Piojillo ( <i>Poa annua</i> ) Ballica ( <i>Lolium spp</i> )	1,0 - 1,5	Aplicar de pre-emergencia del cultivo, con buena humedad de suelo. Al tratar toda la superficie considerar mojado de mínimo 300 L de agua por ha.

Para todos los cultivos, realizar máximo una aplicación por temporada. Aplicar la dosis mayor cuando ha habido una alta presión de malezas en la temporada anterior, cuando se detecte una emergencia abundante de malezas y/o cuando las labores de preparación de suelos no fueron del todo óptimas.

**Preparación de la Mezcla:** Agregar al estanque con poca agua la cantidad necesaria de **METRIPHAR® 480 SC**. Luego llenar el estanque de la bomba con agua bajo agitación continua.

**Incompatibilidad:** No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción alcalina.

**Compatibilidad:** Normalmente se emplea sólo. Es compatible con Hache Uno 2000 175 EC, Ustinex 80% WP.

**Fitotoxicidad:** En variedades de papas de piel blanca, aplicar sólo en preemergencia. En tomates no aplicar en cultivos bajo plástico. No aplicar en suelos arenosos.

**Tiempo de Reingreso al área tratada (personas y animales):** 4 horas. Una vez seco el producto sobre el follaje, es posible reingresar al área tratada.

**Periodo de carencia:** Tomates, papas, lupino: 60 días. Espárragos: 14 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

**Otras informaciones:** Usar de preferencia bomba manual de espalda o equipo provisto de barra pulverizadora, con un gasto de 400 a 600 L de agua/ha. Aplicar en suelo húmedo. Utilizar dosis más bajas en suelos livianos y de bajo contenido de materia orgánica. La persistencia y acción de este producto depende principalmente de las condiciones atmosféricas y del tipo de suelo. Efectuar labor profunda si el suelo se cultiva antes de 6 meses de realizada la aplicación. Si no tiene experiencia con este producto en el predio, aplique sólo en un sector representativo. Su uso requiere asesoría de especialista para cada caso. El producto no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvia, predominio de vientos fuertes, presencia de heladas, estrés hídrico o cualquier otra condición ambiental desfavorable.

**NOTA AL COMPRADOR:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®Metriphar es marca registrada.



**NOCIVO**

