

**INSTRUCCIONES DE USO**

**PODASTIK® PRO** es un fungicida que se utiliza para el control preventivo de enfermedades causadas por hongos de la madera en cultivos de Frutales, Frutales Menores, Vides, Forestales y Ornamentales, según las instrucciones de esta etiqueta. **PODASTIK® PRO** ha sido formulado como una pasta fungicida para ser aplicado directa e inmediatamente sobre los cortes de poda recién efectuados, evitando así la entrada de hongos que afectan a la madera.

**Cuadro de Instrucciones de Uso**

FRUTALES	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Carozos: Durazneros, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Nectarinos, Almendros y Plum Cot.	Enfermedades de la Madera: Plateado ( <i>Chondrostereum purpureum</i> ).	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> directamente sobre el corte de poda o herida de injertación y decapitación de patrón.	La aplicación de pintura debe realizarse en invierno, inmediatamente después de efectuados los cortes de poda e injertación, cubriéndolos completamente.
Pomáceas: Manzanos, Peral y Peral Asiático.	Enfermedades de la Madera: Plateado ( <i>Chondrostereum purpureum</i> ).	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> directamente sobre el corte de poda o herida de injertación y decapitación de patrón.	La aplicación de la pintura debe realizarse en los meses de invierno, inmediatamente después de podar, cubriendo los cortes completamente.
Manzanos	Cancro Europeo o Nectria ( <i>Nectria galligena</i> ).	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> la madera después de removido el cancro.	La curación y aplicación de pintura debe realizarse en los meses de invierno inmediatamente después de la extracción de los cancos.
Paltos Cítricos: Limoneros, Naranjos, Mandarinos, Clementinas, Pomelos, Ciemenules, Nogales.	Pudrición del Pie: <i>Phytophthora parasitica</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Phytophthora cactorum</i> .	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> la herida provocada por la extracción del cancro, para favorecer la cicatrización de ésta.	La curación y aplicación de pintura debe realizarse en los meses de invierno inmediatamente después de extirpadas las lesiones.
Frutales Menores: Arándanos, Frambuesos, Grosellos, Moras, Cranberry.	Plateado ( <i>Chondrostereum purpureum</i> ).	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> directamente sobre el corte de poda o herida.	La aplicación de pintura debe realizarse en los meses de invierno inmediatamente después de la poda.
Árboles Forestales y Ornamentales.			
Uva de Mesa, Parronales, Viñas y Kivis.	Enfermedades de la madera: Enrollamiento Clorótico ( <i>Fomitiporella vitis</i> ), Plateado ( <i>Chondrostereum purpureum</i> ) (*), Brazo muerto de la vid.	Pintar con <b>PODASTIK® PRO</b> directamente sobre el corte de poda o herida de injertación y decapitación de patrón.	La aplicación de pintura debe realizarse en los meses de invierno inmediatamente después de efectuados los cortes de poda.

(\*) Aplica sólo en Kivis

**APLICACION:** Preparación de la mezcla: Revuelva muy bien el envase antes de usar. No es necesario preparar la mezcla o diluir. El producto viene listo para pintar los cortes de poda o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuado el corte. Evite pintar si hay riesgo de lluvias durante o inmediatamente después de la aplicación. Aplique una vez en la temporada.

**COMPATIBILIDAD:** **PODASTIK® PRO** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina y aceites minerales. Por su formulación no es necesario mezclarlo con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD:** Siguiendo las instrucciones de uso **PODASTIK® PRO** no es fitotóxico.

**PERIODO DE CARENIA (DÍAS):** No tiene carencia, no corresponde.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Para las personas no hay restricciones de reingreso al área tratada, en el caso de animales no corresponde establecer tiempo de reingreso por el tipo de cultivo al cual se aplica.

©**PODASTIK** es Marca Registrada de **Arysta LifeScience Chile S.A.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Tebuconazol, pertenece al grupo de los triazoles y Clorotalonilo pertenece al grupo químico de los cloronitrilos. Se debe evitar su inhalación, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Durante la aplicación, usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. No verter en ríos, lagos o lagunas. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Los síntomas de intoxicación pueden ser cefalea, somnolencia, vértigo, irritación dermal y ocular, disnea, náuseas y vómitos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión hacer dilución y lavado gástrico con suero salino, luego administrar absorbente 5 grs. de carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 grs. de Sulfato de Sodio en 500 cc. de agua usado como laxante. Llame inmediatamente un médico. En caso de contacto con la piel, retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. En caso de usar lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar en el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación retire al paciente al aire libre. En caso de vómito espontáneo, despejar el tracto respiratorio. No suministrar sustancias vía oral a persona inconsciente. Eliminar las ropas contaminadas. Llame a un médico.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Aplicar tratamiento base.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**ECOTOXICIDAD:** **PODASTIK® PRO** es prácticamente no tóxico a aves, ligeramente tóxico a peces, y virtualmente no tóxico a abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**

**Instrucciones para Triple Lavado:** Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

**En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 22635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA/Chile: fonos 22777 1994, Santiago. El teléfono del importador es: 22560 4500, Santiago, Chile.**

**NOTA AL COMPRADOR:**

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda la responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

**PODASTIK® PRO**

FUNGICIDA  
PASTA (PA)

Lote N°  
Fecha Vencimiento:

**PODASTIK® PRO** es un fungicida que se utiliza para el control preventivo de enfermedades causadas por los hongos de la madera mencionados en el cuadro de usos y dosis en: cultivos de Frutales, Frutales Menores, Vides, Forestales y Ornamentales, según las instrucciones de esta etiqueta. **PODASTIK® PRO** ha sido formulado como una pasta fungicida para ser aplicado directa e inmediatamente sobre los cortes de poda recién efectuados, evitando así la entrada de hongos que afectan a la madera.

**COMPOSICION:**

\*Tebuconazol .....0,5% p/v (5 g/L)  
\*\*Clorotalonilo .....5% p/v (50 g/L)  
Cofomulantes, c.s.p .....100% p/v (1 L)  
\* (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol  
\*\* Tetracloroisofaltonitrilo

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

**Contenido Neto Aprox.: 3,8 Litros**

**Distribuye:**  
**Arysta LifeScience Chile S.A.**  
El Rosal 4610, Huechuraba,  
Santiago, Chile  
ET2693V-003-3.8  
OS1

Autorización del  
Servicio Agrícola y  
Ganadero N° 2.693

**Fabricado por:**  
**Industrias Ceresita S.A.**  
Lo Echevers 801, Quilicura,  
Santiago - Chile



**CUIDADO**

