

Atención apicultores y apicultoras de zonas afectadas por inundaciones



Si se encuentra en zonas afectadas por inundaciones, debe considerar los siguientes manejos apícolas en el apiario, para lograr sobrevivencia de colmenas:

Fusionar las colmenas:

- Si la colmena se encuentra invernando con una escasa población de abejas (menos de 6 marcos de abejas por colmena), se considera que la colmena se encuentra débil para la invernada, se recomienda fusionar la colmena. Adicionalmente, puede optar a reducir el interior de la colmena, que no se encuentre ocupado por las abejas utilizando un tabique

Alimentación para la mantención de las colmenas:

- Las colmenas con escasez de alimento en miel (menos de 5 marcos de miel zona central y menos de 7 marcos zona centro sur del país), se les debe proporcionar alimento seco como: torta proteica (dulce o amarga) o candi. No se recomienda hacerlo con "jarabe", esto para evitar incentivo de postura e incremento de la humedad al interior de la colmena, en período de invernada.
- Utilizar alimento localizado entre o sobre los cabezales de los marcos, donde se localiza el bolo invernal de la colmena.
- Para evitar que a la colmena le falte alimento, se debe revisar constantemente para ir reponiéndolo.

Manejo de las colmenas:

- Evite reproducir o dividir las colmenas en este período.
- Debe procurar que el material apícola esté seco al interior de la colmena, de lo contrario reemplazar el material o fusionar la colmena con otra que se encuentre en buenas condiciones de tamaño poblacional y reservas alimenticias.
- Debe colocar las colmenas separadas del suelo para evitar la humedad directa y procurar que se encuentren despejadas de malezas o vegetación por debajo y alrededor de ellas, para facilitar su ventilación.
- Inclinar levemente la colmena hacia adelante para evitar ingreso de humedad y facilitar el drenaje de ésta.
- Disponer las colmenas del apiario con una separación entre ellas (de al menos la mitad del ancho de una colmena), con el fin de favorecer la aireación y ventilación de la humedad de las paredes externas de la colmena.



Atención apicultores y apicultoras de zonas afectadas por inundaciones



Evitar pillaje en el apiario:

- Realice el manejo apícola temprano o al atardecer del día, cuando hay menos actividad de vuelo de las abejas.
- Procure tapar todo orificio o fisura en las colmenas, excepto la propia piquera de la colmena.
- No deje residuos de miel y cera en el apiario.

Efectuar control sanitario en el apiario:

- Se recomienda efectuar control de Nosemosis en colmenas en zonas húmedas y que hayan estado débiles en población de abejas. Efectuar tratamiento con fármacos autorizados a la salida de la invernada, para evitar la desnutrición de las abejas y mortalidad de los ejemplares adultos.
- Efectuar control de Varroasis (infestación sobre 3%) con fármacos autorizados, para evitar la mortalidad de abejas a la salida de la invernada.

Importante considerar: las colmenas deben estar alimentadas y con una población de abejas fuertes o fusionadas antes de efectuar control sanitario.

www.sag.cl



@sagchile



sagminagri



SAGChile



@sagchile

