

# X-TREM® 50 SC

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.616

**X-TREM® 50 SC**, fungicida con acción de contacto, indicado para el control de hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

## COMPOSICIÓN:

* Kresoxim-metilo .....	50% p/v (500 g/l)
Coformulantes, c.s.p.....	100% p/v (1 l)
* (E)-metoxiimino[2-(o-toliloximetil)fenil]acetato de metilo	

**<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>**

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**

Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
LAMPA - CHILE

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,  
Zhejiang, China

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**X-TREM® 50 SC**, es un fungicida cuyo ingrediente activo Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de los Oximinoacetatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**X-TREM® 50 SC**, es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos, aves y abejas.

**<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>**

**<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>**

**<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>**

**<<NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>**

**<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>**

**Instrucciones para Triple Lavado:** para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Inutilizar el envase y eliminarlo de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

**Antídoto:** Administrar alcohol etílico (CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>OH) al 5% iv. ( 2 a 3 litros en 12 a 18 horas).

**Tratamiento médico de Emergencia:** En caso de ingestión de una cantidad importante, diluya con mediana cantidad de agua, realice una aspiración nasogástrica y luego practique un lavado gástrico.

**Primeros auxilios:** En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y lave con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua corriente fría por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. Síntomas posibles: diarrea, acidosis.

**<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>**

**Teléfono de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); 24869000 (ANASAC)**

**<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>**

Conserve **X-TREM® 50 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

© Marca registrada por ANASAC



**CUIDADO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**X-TREM® 50 SC**, fungicida con acción de contacto, indicado para el control de sarna o venturia, botritis y oídio en manzano, peral, vides, tomate y ajo.

### Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS (cc/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Manzano Peral	Venturia, Oídio	200	Aplicar desde inicio de floración hasta fruto formado, en forma preventiva, alternando con fungicidas de distinto modo de acción. Efectuar 1 o máximo 2 aplicaciones por temporada, de manera no consecutiva. Volumen de agua sugerido: 1500 L/ha.	10
Vides	Oídio, Botritis	200	Aplicar en forma preventiva cada 15 días, desde brote de 80 cm hasta cierre de racimos. Durante este período efectuar como máximo dos aplicaciones del fungicida. Volumen de agua sugerido: 1500 L/ha.	7
Tomate	Oídio, Botritis	200	Realizar las aplicaciones en forma preventiva, alternando con productos de diferente modo de acción. Realizar como máximo 5 aplicaciones por temporada. Volumen de agua sugerido: 1000 L/ha.	1
Ajo	Moho azul del ajo	20 cc/100 lt agua	Sumergir los dientes (semillas de ajo) por 6 horas en la suspensión y posteriormente sembrar. Utilizar la dosis indicada para 1.000 kg de semilla.	N.C.

N.C.: No corresponde por momento de aplicación.

No aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.

Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.

No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

**PRECAUCIÓN PARA ABEJAS: X-TREM® 50 SC está clasificado como Ligeramente tóxico para abejas por lo que se recomienda que las aplicaciones a cultivos que estén en período de floración se realicen al atardecer, en la noche o temprano en la mañana, cuando no haya actividad de las abejas.**

**Esto es válido para cultivos con flores que sean atractivas para abejas.**

**Preparación de la mezcla:** Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **X-TREM® 50 SC**, luego completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad: X-TREM® 50 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

**Incompatibilidad: X-TREM® 50 SC** Es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 11 o menores a 3.

**Fitotoxicidad:** No presenta en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



**CUIDADO**

