

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** Azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.

## Precauciones de uso:

**AZUFRE 350 AGROSPEC** es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: no comer, beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

**Durante la preparación** usar de protección, antiparras, delantal impermeable, botas de goma, guantes impermeables y máscara con filtro.

**Durante la aplicación** usar de protección, antiparras, overol impermeable, botas de goma, guantes impermeables y máscara con filtro. No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

A la dosis de aplicación, **Azufre 350 Agrospec**, es prácticamente no tóxico para peces y aves y virtualmente no tóxico para abejas.

## Síntomas de intoxicación:

En caso de inhalación puede causar irritación a las fosas nasales y tracto respiratorio y el pulmón. En contacto con la piel puede causar grave irritación y quemadura. En contacto con los ojos puede causar grave irritación y quemadura además enrojecimiento, lagrimeo y molestias. convertirse en sulfuro de hidrógeno en el intestino.

En caso de ingestión puede producir fatiga, vómitos, diarrea y posiblemente inconsciencia.

## Antídoto:

No es un producto tóxico. Sin antídoto específico.

## PRIMEROS AUXILIOS:

**En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de ser necesario, acudir a un médico.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirar los y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediatamente.

**En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Buscar asistencia médica.

**En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar asistencia médica.

**Tratamiento médico:** Tratamiento sintomático, base.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,  
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON  
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS  
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS  
VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS  
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,  
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO  
INDICADO DE REINGRESO**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO**

**PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES  
ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE**

En caso de intoxicación llamar :  
Centro Atención Toxicológica UC (CITUC)  
teléfono: 56 2 2635 3800 (24 horas)  
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

V19032019

# AZUFRE 350 Agrospec

Fungicida  
POLVO SECO (DP)

Fungicida preventivo de contacto para el control de oídio en los cultivos mencionados en las instrucciones de uso de esta etiqueta, principalmente para parronales y viñas.

## COMPOSICIÓN:

**Ingredientes Activos:** % p/p

Azufre 95,0 % p/p (950 g/kg)  
Coformulantes, c.s.p. 100% p/p (1kg)

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2528**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:

**Agrospec**

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile

Teléfono: 56 2 2836 8000

agrospec.cl

**INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

# INSTRUCCIONES DE USO

## Descripción:

**AZUFRE 350 AGROSPEC** es un fungicida preventivo de contacto, posee un tamaño de partícula que permite una excelente penetración del producto y una prolongada permanencia en el tiempo en la superficie aplicada.

## Instrucciones de uso:

Para ser aplicado vía terrestre, esta última por medio de un equipo convencional espolvoreador (AZUFRADORA).

## Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicaciones Terrestres

Cultivo	Enfermedad	Dosis* Kg/ha	OBSERVACIONES
Viñas y Parronales	Oídio <i>Erysiphe necator</i>	20 - 25	Aplicar como preventivo. Iniciar con brotes de 10 - 15 cm. y repetir cada 8 - 12 días. N° de aplicaciones: 10
Ciruelo Almendro Duraznero Nectarin Manzano Naranja Limónero Mandarino Pomelo Paltos	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	20 - 25	Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 3
Tomate Zapallo Pepino Melón Alcachofa Arveja Frejol Sandía Pimentón Papa Remolacha azucarera	Oídio <i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Erysiphe poligony</i>	20 - 25	Aplicar de forma preventiva, o al observar los primeros signos de la enfermedad, repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 2
Rosas Hortensias Claveles Gladiolos	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i>	20 - 25	Aplicar en forma preventiva o bien al observar los primeros signos. Repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 2

## Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicaciones Aéreas

Cultivo	Enfermedad	Dosis Kg/ha	OBSERVACIONES
Viñas y Parronales	Oídio <i>Erysiphe necator</i>	20 - 25	Utilizar la dosis por hectárea, asegurando un adecuado cubrimiento de la periferia de las plantas. Repetir cada 8 - 12 días. N° de aplicaciones: 10
Naranja Limónero Mandarino Pomelo Paltos	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	20 - 25	Utilizar la dosis por hectárea, asegurando un adecuado cubrimiento de la periferia de las plantas. Repetir de ser necesario cada 8 a 12 días. N° de aplicaciones por temporada: 3

\*Utilizar dosis mayor cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para una mayor presión de la enfermedad.

**Precauciones:** Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), no aplicar con T° mayores a 25°C o alta humedad ambiental.

**Fitotoxicidad:** Si es utilizado a las dosis y en los momentos recomendados, el producto no es fitotóxico. No aplicar en damascos por ser fitotóxico a este frutal.

**Incompatibilidad:** Es incompatible con Formetanate HCL. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 24 horas después de ser aplicado; para animales no corresponde, porque el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

**Carencia (días):** Sin restricciones.

**Nota del fabricante:** El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



## CUIDADO

