

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: FUNGAFLOR 75 SG es un producto en base a Imazalilo, perteneciente al grupo químico de los Imidazoles.

Para su preparación y aplicación vestir elementos de protección personal, guantes impermeables, botas de goma resistentes a sustancias químicas, anteojos de seguridad, delantal impermeable y mascarilla para polvos, lavarse adecuadamente después de la preparación y aplicación.

No se debe comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Después de manipular y usar el producto, lavarse con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Precauciones de Almacenaje:

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, bien ventilado, bajo llave.

Información Ecotoxicológica:

Producto moderadamente tóxico para peces, no tóxico para abejas y aves.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<< NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

<<EN APLICACIONES DE POSTCOSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN>>

Síntomas de Intoxicación: Es peligroso si es ingerido. Puede causar sensibilización por el contacto repetido con la piel. Los síntomas de intoxicación son temblores, ataxia, sedación, lacrimación, pérdida de reflejos, edema pulmonar y parpadeos repetidos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de **contacto con los ojos**: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Buscar atención médica.

En caso de **inhalación**: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar atención médica.

En caso de **ingestión**: **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar al médico.

En caso de **contacto con la piel**: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Antídoto: No se conoce antídoto conocido.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de emergencia:

Rita: (56 2) 2661 9414 – 2777 1994

SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.: +56 228350500

FUNGAFLOR 75 SG

FUNGICIDA GRANULADO HIDROSOLUBLE (SG)

FUNGAFLOR 75 SG es un fungicida de contacto para uso post cosecha en cítricos (limones, naranjas, pomelos, clementinas y mandarinas), en plantas embaladoras de fruta, para el control de *Penicillium spp.*

COMPOSICIÓN:

Imazalilo (*).....75% p/p (750 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

*(RS)-1-(β -aliloxi-2,4diclorofeniletil)imidazol

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
Nº 2.555**

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote Nº:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Cont. Neto: X Kg.

Fabricado por:

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse.
Bélgica

SCHIRM GMBH

Strasse 229 in D-23568 Lubeck
Alemania

Importado y Distribuido por:

SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.
Avda. Presidente Kennedy 5735 - Of.1601 - Torre Poniente
Las Condes - Santiago de Chile
Teléfono: +56228350500

 **Pace International**
División Postcosecha
 SUMITOMO CHEMICAL CHILE

INSTRUCCIONES DE USO:

En cítricos (limones, naranjas, pomelos, clementinas y mandarinas), en plantas embaladoras de frutas.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO (especie)	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Cítricos: (Limones, naranjas, pomelos, clementinas, mandarinas)	<i>Penicillium spp.</i>	130 g/100 L	Drencher o ducha en la línea de empaque.
Cítricos: (Limones, naranjas, pomelos, clementinas, mandarinas)	<i>Penicillium spp.</i>	200 g/100 L	Para aplicación en cera, mantener sistema de agitación.

Preparación de la mezcla: Mezclar con la solución de la ducha o drench, o bien, en la cera en el proceso de encerado.

Época y modo de aplicación: Aplicar en postcosecha en ducha o en el proceso de encerado, en plantas embaladoras de fruta. El producto es aplicado en postcosecha en un proceso, en uno o varios puntos de la línea de empaque de la fruta, por lo tanto no corresponde definir frecuencia de aplicación.

Compatibilidad: Compatible con ceras.

Incompatibilidad: Incompatible con productos alcalinos.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones.

Tiempo de Reingreso: Como el producto se aplica en la cinta de embalaje, no corresponde definir un tiempo de reingreso al área tratada.

Período de Carencia: No corresponde dado el momento de aplicación del producto.

NOTA AL COMPRADOR:

El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.



CUIDADO

