

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo químico: el ingrediente activo Propiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles y el ingrediente activo Ciprodinilo pertenece al grupo químico de las anilinoimidazolidinonas.

- **durante su manejo:** vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, antiparras, máscara con filtro, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, antiparras y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Irritante para la piel y los ojos. No respirar el producto concentrado ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar inmediatamente a un médico. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

PARA APLICACIONES AÉREAS, RESPETAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

- **después de su manejo:** lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar su trabajo; lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Instrucciones para el Triple Lavado: una vez vacío el envase, agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido en la máquina pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir los envases vacíos (cortándolos y perforándolos) y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forrajes. Evitar almacenar por encima de 35° C y por debajo 5° C.

Síntomas de intoxicación: No hay sintomatología específica. Podría causar edema pulmonar y neumonitis por aspiración.

Primeros auxilios: en caso de sospechar una intoxicación, detener inmediatamente el trabajo y llamar a un médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto con la piel o ropa, retirar ropa y zapatos, lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si las molestias persisten, consultar a un médico. **En caso de contacto con los ojos,** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague, consultar a un médico o CITUC. **En caso de inhalación,** llevar al afectado en un lugar bien ventilado. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente a un médico llevando la etiqueta. **En caso de ingestión,** buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado.

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

Nota: este producto contiene hidrocarburo aromático.

Información ecotoxicológica: muy tóxico para organismos acuáticos, moderadamente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA”

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

En caso de INTOXICACION llamar al ☎: 2 2635 3800

En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 2 2247 3600

Consultas a Syngenta S.A.: 2 2941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile

18/04/17

STEREO®

**FUNGICIDA
Concentrado Emulsionable (EC)**

Composición:

Propiconazol * 6,25 % p/v (62,5 g/L)
Ciprodinilo** 25 % p/v (250 g/L)
Coformulantes, c.s.p. 100 % p/v (1 L)

* (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol.

** 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

STEREO® es un fungicida sistémico, recomendado para el control preventivo y curativo de enfermedades de la caña y del follaje de los cereales (trigo, cebada, avena, centeno, triticale) y del cultivo de raps o canola.

Aplicaciones tempranas en cereales, dirigidas al control de Mancha ocular de la caña, son también muy efectivas para enfermedades como Septoriosis, Oidio, Royas o Polvillos y Rincosporiosis, si estos patógenos se encuentran presentes al momento de la aplicación. También se recomienda su uso para el control de Pie negro y Pseudocercospora en raps o canola.

Contenido Neto del Envase:

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2800

Fabricado por:

Syngenta Crop Protection Monthey A.G., PO Box 273, Route de L'île au Bois, Monthey, Suiza

Schirm GmbH Schönebeck, Geschwister-Scholl-Strasse 127,

39218 Schönebeck/Elbe, Alemania

Importado y Distribuido por:

Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201 – Teléfono: 2 2941 0100, Santiago - Chile

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se recomienda la aplicación de **STEREO®**, hasta 2 veces en la temporada con un intervalo entre aplicaciones de 21 a 42 días, dependiendo de la presión de las enfermedades y de acuerdo a los siguientes programas de tratamiento terrestre y aéreo:

Cultivos	Enfermedades	Dosis (L/ha)	Observaciones
Cereales (Trigo, Cebada, Avena, Centeno y Triticale)	Mancha ocular (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1,6 - 2,0	Siempre por vía terrestre, aplicar con el primer nudo visible a un centímetro sobre el suelo en su macolla principal (estado GS 31 a 32 de la escala Zadocks), para llegar a la base de las macollas y con un mínimo de 150 L de agua/ha. Utilizar la dosis mayor y el intervalo menor en condiciones de alta presencia de enfermedades.
	Enfermedades foliares: Septoriosis (<i>Septoria</i> spp.), Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>), Royas o Polvillos (<i>Puccinia</i> spp.) y Rincosporiosis o Escaldadura (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1,6 - 2,0	Aplicar preferentemente en forma preventiva, vía aérea o terrestre. Si se aplica en forma curativa, hacerlo tan pronto como aparezcan los primeros síntomas. Utilizar la dosis mayor y el intervalo menor en condiciones de alta presencia de enfermedades.
Raps o Canola	Pie negro (<i>Phoma lingam</i>) Pseudocercospora (<i>Pseudocercospora capsellae</i>)	1,5 - 2,0	Aplicar preventivamente o a la aparición de los primeros síntomas hasta el estado de roseta. Utilizar la dosis mayor y el intervalo menor en condiciones de alta presión de la enfermedad.

Nota: Dirigir siempre las aplicaciones al follaje, mojando bien toda la planta. Utilizar baja presión y aplicar en horas de poco viento para evitar deriva.

Volumen de agua: aplicar con un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento y distribución del producto sobre el cultivo.

- Aplicación aérea: mínimo 40 L/ha.
- Aplicación terrestre: 100-300 L/ha.

Método de preparar la mezcla: colocar la cantidad de **STEREO®** necesaria en el estanque del equipo de aplicación parcialmente lleno de agua, mientras el agitador funciona. Luego, agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado.

Compatibilidad: **STEREO®** puede aplicarse en mezcla con el regulador de crecimiento **MODDUS® 250 EC**, con herbicidas como **LOGRAN® 75 WG** y/o **TOPIK® 240 EC**, y con fungicidas e insecticidas usados corrientemente. En raps o canola puede emplearse en mezcla con **AGIL® 100 EC**, **CAIMAN® 70 WG**, **KARATE® con Tecnología ZEON**, **PIRIMOR®** y Carbendazima.

Incompatibilidad: como es imposible conocer la compatibilidad de **STEREO®** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Fitotoxicidad: si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Período de carencia: para mercado local se recomienda dejar un intervalo de 35 días para cereales y 60 días para raps o canola, entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada antes de 12 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

Observación: el fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y fecha de vencimiento anula toda garantía. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral. Para cualquier información respecto a Límites Máximos de Residuos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.



CUIDADO

