

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: VONDOZEB 75 WG es un producto en base a Mancozeb, el cual pertenece al grupo químico de los alquilbenbis (ditiocarbamatos).

Durante la preparación y aplicación, evitar contacto con ojos y piel. **Durante la preparación usar:** guantes impermeables, protector facial, overol impermeable y botas de goma. **Durante la aplicación usar:** guantes impermeables, protector facial, overol impermeable y botas de goma. No comer, beber o fumar, ni exponerse a la niebla del producto durante la preparación y aplicación. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. Lavar toda la piel expuesta antes de comer beber e ir al baño. Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico para las abejas ni para las aves. Tóxico a peces. No contaminar aguas de regadío, agua potable, cursos de agua o ríos.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Síntomas de Intoxicación: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

Contacto con la Piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consulte a un médico.

En caso de Ingestión: Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Buscar atención médica.

En caso de Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar atención médica.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: No dar sustancias que favorezcan la absorción, como leche, alcohol y grasa. Administrar carbón activado.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: RITA CHILE:(2) / 2777 1994

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Almacenaje: Conserve **VONDOZEB 75 WG**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

VONDOZEB 75 WG**FUNGICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)**

VONDOZEB 75 WG es un fungicida de contacto, con acción preventiva sobre un amplio espectro de enfermedades fungosas, para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICION:

Mancozeb*.....75% p/p (750 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

*Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cincúica.

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
Nº 2.273**

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote Nº:

Fecha de Fabricación: (mes y año)

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Fabricado por:

Cerexagri B.V.
Tankhoofd 10, 3196 KE, Rotterdam.
Holanda

UPL Limited
Uniphos House,
Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
Mumbai – 400 052.
India.

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO

VONDOZEB 75 WG es un fungicida de contacto, con acción preventiva sobre un amplio espectro de enfermedades fungosas, para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Manzanos Perales	Venturia	4 – 5 Kg/ha o 200 – 240 g/100 L de agua	Aplicar desde puntas verdes a caída de pétalos cada 7 días. Presenta 18 a 24 horas de efecto retroactivo (acción erradicante). Mojamiento entre 500 – 2000 L/ha. Máximo 10 aplicaciones por temporada.	Manzanas 21 Perales 15
Papas Tomates	Tizón temprano Tizón tardío	1,5 – 2,5 Kg/ha	Aplicar preventivamente, repetir cada 7 a 10 días. En caso de lluvias repetir de inmediato. Mojamiento entre 200 – 1000 L/ha. Máximo 10 aplicaciones por temporada.	Papas 0 Tomate fresco 5
Apio Cebolla Espárrago	Septoriosis Botritis Midiú Mancha púrpura			7 días
Almacigueras de cultivos frutales y anuales, especies forestales y ornamentales	Control de caída de almácigos (<i>Pythium ultimum</i>)	100 – 200 g/100 L de agua	Regar semanalmente el almácigo durante la germinación y emergencia de las plántulas. Máximo 3 aplicaciones por temporada.	No corresponde

No aplicar en caso de lluvia inminente.

No aplicar después de lluvias recientes.

No aplicar contra el viento, ni cuando las condiciones ambientales favorezcan la deriva.

No aplicar con temperaturas extremas, ni en horas de calor.

Aplicar sólo cuando las condiciones meteorológicas en el lugar del tratamiento permiten una cobertura total del cultivo.

No aplicar cerca de fuentes de agua. Evitar la deriva de la pulverización en fuentes de agua, y en áreas que no son el blanco.

Evitar presiones y tipos de boquilla que puedan dar lugar a partículas finas (niebla) y favorecer la deriva. No aplicar en los períodos calmos o cuando la velocidad y dirección del viento representan un riesgo de deriva.

No pulverizar cuando el viento está soplando hacia un cultivo vecino sensible, jardín, hábitat terrestre (como el cinturón de protección) o hábitat acuático.

Preparación de la mezcla: Llénese el estanque con agua hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de producto a utilizar en una pequeña cantidad de agua y posteriormente con los agitadores en funcionamiento agréguela al estanque completando el volumen de agua requerido.

Incompatibilidad: VONDOZEB 75 WG es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Tiempo de Reingreso al área tratada: 6 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentación de éstos

Nota al Comprador: Garantizamos la calidad y contenido de ingredientes activos señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivados de su uso manipulación o almacenaje.



CUIDADO

