

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico: DEVRINOL® 10 G** es un producto en base a Napropamida, el cual pertenece al grupo químico de las Acetamidas.

No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y bajo llave, en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación y aplicación** utilizar guantes de goma, antiparras, delantal impermeable y botas de goma. Alejar a animales domésticos y personas extrañas. No aplique con viento. No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Después de cada jornada, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

**Riesgos Ambientales: Devrinol 10 G** es considerado como moderadamente tóxico para peces. No es tóxico a las aves ni a las abejas. El producto no debería presentar ningún peligro si es usado de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

**Síntomas de Intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, lavar los ojos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar al médico.

**Contacto con la piel:** Lávela inmediatamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre, pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consultar a un médico.

**Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consultar a un médico.

**Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén. Si es necesario, realizar lavado gástrico. Prevenir la aspiración de contenidos gástricos.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

### Teléfonos de Emergencia:

RITA CHILE: (56-2) 2777 1994

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56-2) 2635 3800

CITUC Químico (Emergencia química): (56-2) 2247 3600

## DEVIRINOL® 10 G

### HERBICIDA GRANULADO (GR)

Herbicida residual de pre-emergencia incorporado, que controla una amplia gama de malezas de hoja ancha y angosta en estado de semilla en arbustos y árboles ornamentales y cranberries, todas indicadas en cuadro de instrucciones de uso.

#### Composición:

Napropamida\*.....10% p/p (100 g/kg)

Coformulantes c.s.p.....100% p/p (1 kg)

<sup>\*</sup>(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftiloxi)propionamida.

**Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.296**

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO**

N° de Lote :

Fecha Fabricación (mes y año):

Fecha Vencimiento:

Contenido neto:

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

#### Fabricado por:

United Phosphorus Inc.

423 Riverview Plaza

Trenton, NJ08611

Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

## INSTRUCCIONES DE USO

**Devrinol 10 G** es un herbicida residual de pre-emergencia incorporado, que controla malezas de hoja ancha y angosta en estado de semilla en arbustos, árboles ornamentales de hoja caduca y perenne y cranberries, todas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

### Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Malezas	Dosis	Observaciones
Cranberries	<b>De hoja ancha:</b> Alfilerillo, Bledo, Hualputra, Lechuguilla, Nihue, Pasto pinito, Quingüilla, Sanguinaria, Tomatillo, Verdolaga, Verónica, Calabacillo, Manzanillón.	40 - 60 Kg/ha	<b>Devrinol 10 G</b> puede ser aplicado en las especies indicadas, sólo 1 vez por temporada, de preferencia en otoño-invierno, esparciéndolo sobre la superficie del suelo donde se quiere controlar malezas.  <b>Devrinol 10 G</b> es incorporado en el suelo con lluvias o riego.
<b>Árboles:</b> Acer, Crategus, Malus, Picea, Populus, Prunas	<b>De hoja angosta:</b> Avenilla, Ballica, Pasto cebolla (semilla), Hualcacho, Pasto del perro, Pata de gallina, Pega- pega, Maicillo (semilla), Piojillo, Vulpia.		
<b>Arbustos:</b> Espárrago, Hibisco, Pitosporus, Junípero, Rosa, Rododendro			

Utilizar la dosis menor en caso de baja presión de malezas. Utilizar dosis mayor con fuerte presión de malezas.

#### Aplicación:

No aplicar cuando las malezas ya emergieron.

Aplicar en suelos bien mullidos y limpios.

Inmediatamente después de la aplicación, debe incorporarse a la superficie del suelo.

Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.

No controla malezas establecidas.

Debe ser aplicado al suelo recién desmalezado antes que las malezas germinan o durante los meses de otoño e invierno.

Puede ser aplicado en plantaciones nuevas; a un stock de plantas crecidas en contenedores, que haya sido después establecido en suelos desde el primer riego; a un stock de plantas crecidas en vivero; y para el establecimiento de plantas.

Necesita incorporación mecánica, riego adecuado o humedad natural (lluvia o niebla) para obtener resultados óptimos. Si la lluvia no se produce dentro de 7 días para una aplicación de primavera u otoño o 2 días para una aplicación de verano, es necesaria una incorporación superficial a una profundidad de 2,5 a 5 cm o un riego (aspersión o inundación) con agua suficiente para humedecer el suelo a una profundidad de 5 a 10 cm. El tratamiento debe alcanzar la zona de germinación de la semilla de la maleza.

**Incompatibilidad:** No se conocen casos reportados de incompatibilidad de **Devrinol 10 G** con otros agroquímicos. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

**Fitotoxicidad:** **Devrinol 10 G** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

**Período de Carencia:** **Devrinol 10 G** es un herbicida que se aplica al suelo antes de la emergencia de las malezas, por lo que no posee período de carencia. Para exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

**Tiempo de Reingreso:** Se recomienda tanto para personas como animales no ingresar hasta haber transcurrido 1 hora después de la aplicación.

#### Nota al Comprador:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento, distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



CUIDADO

