PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: VONDOZEB es un producto en base a Mancozeb, el cual pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos).

Evitar que el producto entre en contacto con ojos y piel. Usar ropa protectora adecuada. **Durante la preparación:** utilizar guantes de goma, protector facial, mascarilla para polvos, overol impermeable y botas de goma. **Durante aplicación:** utilizar overol impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. No comer, beber o fumar, ni exponerse a la niebla del producto durante la preparación y aplicación. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. Lavar toda la piel expuesta antes de comer beber e ir al baño**.** Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico para las abejas ni para las aves. Tóxico a peces. No contaminar aguas de regadío, agua potable, cursos de agua o ríos.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Síntomas de Intoxicación: Dolor de cabeza, nauseas, vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los ojos: Manteniéndolos abiertos, lave con abundante agua durante 15 minutos. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, lavar los ojos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. El producto no diluido puede irritar los ojos. Acuda al médico.

Contacto con la piel: Lávela inmediatamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre, pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si la contaminación es muy grande o si se presenta irritación, buscar atención médica.

En caso de Ingestión: NO INDUCIR VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Solo si el afectado se encuentra consciente, se le puede dar un poco de agua para el enjuague de su boca. Llame a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas inmediatamente.

En caso de Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, si no esta respirando dar respiración artificial. Buscar ayuda médica.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: No dar sustancias que favorezcan la absorción, como leche, alcohol y grasa. Administrar carbón activado. Si presenta dificultad respiratoria, dar oxígeno. Realizar tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia: RITA CHILE:(56-2) 2777 1994.

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **VONDOZEB,** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

VONDOZEB

FUNGICIDA
POLVO MOJABLE (WP)

VONDOZEB es un fungicida de contacto, con acción preventiva sobre enfermedades fungosas, como venturia, tizones, septoriosis, botritis, mildiú y sarna, en variados cultivos, tal como se detalla en el cuadro de instrucciones de uso. Su modo de acción múltiple disminuye la posibilidad de resistencia.

COMPOSICION:

Mancozeb*……..……80% p/p (800 g/kg)
Coformulante c.s.p……....100% p/p (1 kg)

*Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cínquica.

Autorización del
Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.134

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote Nº:
Fecha Fabricación: (mes y año)
Fecha Vencimiento:
Contenido Neto:

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

Fabricado por:
Cerexagri B.V.
Tankhoofd 10, 3196 KE, Rotterdam
Holanda

UPL Limited
Uniphos House,
Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
Mumbai – 400 052.
India

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO

VONDOZEB es un fungicida de contacto, con acción preventiva sobre enfermedades fungosas, como venturia, tizones, septoriosis, botritis, mildiú, y sarna, en varios cultivos, tal como se detalla en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Manzanos Perales	Venturia (*Venturia inaequalis*)	4 – 5 Kg/ha o 200 – 240 g/100 L agua	Aplicar desde puntas verdes a caída de pétalos cada 7 días. Presenta 18 a 24 horas de efecto retroactivo (acción erradicante). Máximo 10 aplicaciones por temporada. Mojamiento entre 500 – 2000 L/ha.	Manzanas 21 Peras 15
Papas Tomates	Tizón temprano (*Alternaria solani*) Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)	1,5–2,5 Kg/ha	Aplicar preventivamente cuando ocurran condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades, repetir cada 7 a 10 días. En caso de lluvias repetir de inmediato. Máximo 10 aplicaciones por temporada. Mojamiento entre 200 – 1000 L/ha.	Papas 0 Tomate fresco 5
Apio Cebolla Espárrago	Septoriosis (*Septoria spp.*) Botritis (*Botritys cinerea*) Mildiú (*Peronospora destructor*) Mancha púrpura (*Stemphilium vesicarium*)			7 días
Almacigueras de cultivos frutales y anuales, especies forestales y ornamentales	Control de caída de almácigos (*Pythium ultimun*)	100-200 g/100 L de agua	Regar semanalmente el almácigo durante la germinación y emergencia de las plántulas. Máximo 3 aplicaciones por temporada. Utilizar la cantidad de agua necesaria para lograr un adecuado mojamiento (1500 - 1000 L/ha). Aplicar con intervalos de entre 5-10 días de acuerdo a la presión de la enfermedad.	No corresponde
Desinfección de Semillas de: Trigo Avena Cebada Centeno	Sarna común (*Streptomyces scabies*) Podredumbres (*Pythium ultimun*)	500 g/100 L de agua	Preparar en medio tambor de 200 litros una solución de Vondozeb sumergiendo completamente la semilla. Por cada 100 kilos de semilla usar 3 L litros de solución. Renovar la solución cada 100 Kg de semilla tratada. Secar a la sombra y sembrar de inmediato. Aplicación única.	No corresponde

Nota: Utilizar las dosis y mojamientos menores en caso de baja incidencia de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas no sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar las dosis y mojamientos mayores en caso de ataques severos, o cuando las condiciones climáticas sean altamente favorables para el desarrollo de la enfermedad. Para los cultivos anuales, 300 a 600 L/ha. Frutales,1.500 a 3.000 L/ha

No aplique si se espera lluvia.
No aplicar inmediatamente después de las lluvias.
No aplicar en contra del viento, o cuando las condiciones ambientales favorecen la deriva.
No aplicar con temperaturas extremas, ni en horas de calor.
Aplicar sólo cuando las condiciones meteorológicas en el sitio del tratamiento permiten una cobertura completa y pareja del cultivo.
No aplicar a ningún curso de agua. Evitar la deriva de la pulverización a cualquier curso de agua o de otras áreas que no son objetivos.
Aerosoles secundarios son menos propensos a la deriva, por lo tanto, evite la combinación de presión y tipos de boquilla que puedan dar lugar a partículas finas (niebla). No aplicar en los períodos de calma o cuando la velocidad y dirección del viento representan un riesgo de deriva.
No pulverizar cuando el viento está soplando hacia un cultivo cercano sensible, jardín, hábitat terrestre o hábitat acuático.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque con agua hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de producto a utilizar, en una pequeña cantidad de agua y posteriormente con los agitadores en funcionamiento agréguela al estanque completando el volumen de agua requerido.

Incompatibilidad: VONDOZEB es incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: Se recomienda tanto para personas como para animales, no ingresar hasta haber transcurrido 6 horas desde la aplicación

Nota al Comprador: Garantizamos la calidad y contenido de ingredientes activos señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivados de su uso