

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Imidacloprid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y las ropas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. Lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo expuestas al producto luego de la manipulación, como así también la ropa utilizada. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Durante la manipulación utilice delantal impermeables, botas y guantes de goma, y protector facial. Durante la aplicación utilizar delantal impermeable, botas y guantes de goma y máscara con filtro.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMETENTE.

NO DESTINAR GRANOS AL CONSUMO DE PERSONAS NI ANIMALES

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, dificultad para respirar, hipotensión, temblores, espasmos musculares. **PRIMEROS AUXILIOS:** para todos los siguientes casos, trasladar al afectado INMEDIATAMENTE a un centro asistencial y/o conseguir ayuda médica. Llevar la etiqueta o el envase.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua.

Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial.

Contacto con la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uña y pliegues cutáneos.

Contacto con los ojos: Retirar lentes de contacto cuando proceda. Lavar los ojos con abundante agua limpia por 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Información al médico tratante. El ingrediente activo de este producto, pertenece al grupo químico de los neonicotinoides. Las medidas generales de tratamiento son: DESCONTAMINACIÓN GASTROINTESTINAL: evaluar realizar lavado gástrico, con suero fisiológico 0,9%, seguido de carbón activado en dosis de 1-2 g/kg de peso en niños y dosis de 50-100 g en adultos, disuelto en 300 ml de agua. Continuar con tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (2) 22777 1994. Rotam de Chile Agroquímica Ltda: (2) 22233 9152

Información ecotoxicológica: Abejas: Altamente tóxico, pero por la forma de uso no las afecta. Aves: moderadamente tóxico. Peces y organismos acuáticos: Prácticamente no tóxico.

Nota de garantía: ROTAM DE CHILE AGROQUIMICA LTDA no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente al indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae de su control directo.

SALUZI®

INSECTICIDA

POLVO DISPERSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS (WS)

SALUZI® es un insecticida de acción tóxica y por contacto, con eficacia por vía sistémica. Su función está destinada al tratamiento de las semillas indicadas en las instrucciones de uso, para las plagas indicadas allí.

COMPOSICION:

Imidacloprid* 70% p/p (700 g/Kg)
Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1Kg)
*1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1729

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Cont. Neto:

Fecha Venc.:

Fabricado por:

Rotam Agrochemical Co. Ltd.

Unit 67, 26/F Trend Centre, No. 29 Cheung

Lee Street,

Chai Wan, Hong Kong

Importado y distribuido por:

Rotam de Chile Agroquímica Ltda.

Providencia 2318 of 31, Providencia.

Santiago-Chile.

INSTRUCCIONES DE USO

SALUZI® es un insecticida sistémico, con acción por contacto y por ingestión. Es absorbido por las raíces, protegiendo las plántulas durante el primer estado de vida.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Ballica	Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde (<i>Hylamorpha elegans</i>)	330g /100 Kg de semilla	Mezclar en seco con la cantidad de semilla por hectárea de siembra, o bien, en húmedo con 4 L de agua por cada 100 kg de semilla. Máximo una aplicación por temporada
	Gusanos alambre (<i>Conoderus rufangulus</i>); Gorgojo argentino (<i>Listronotus bonariensis</i>)	500g /100 Kg de semilla	Mezclar en seco con la cantidad de semilla por hectárea de siembra (30 kilos de semilla/ha), o bien, en húmedo con 4 L de agua por cada 100 kg de semilla. Máximo una aplicación por temporada.
Maíz	Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde (<i>Hylamorpha elegans</i>); Pulgones (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Rhopalosiphum maidis</i> ; <i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Siphum uphorbiae</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>); Gorgojo argentino (<i>Listronotus bonariensis</i>); <i>Delia spp</i> ; Larvas de burrito (<i>Naupactus xanthographus</i>)	500 a 750 g / 100 kg de semilla o bien de acuerdo a la densidad de siembra (0,0014 g/semilla): 110 g para 80.000 semillas 170 g para 120.000 semillas	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla. Agregar 0,8 L de agua por cada 100 kg de semilla. Utilizar la dosis mayor cuando el historial del potrero indique alta presión. Máximo una aplicación por temporada.
	Gusanos alambre (<i>Conoderus rufangulus</i>)	580 a 870 g / 100 kg de semilla, o bien de acuerdo a la densidad de siembra (0,0016 g / semilla): 128 g para 80.000 semillas; 192 g para 120.000 semillas	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla. Agregar 0,8 a 1,5 L de agua por cada 100 kg de semilla. Utilizar la dosis mayor cuando el historial del potrero indique alta presión. Máximo una aplicación por temporada.
Remolacha	Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>); Langostino de la remolacha (<i>Paratatus exitiosus</i>).	130 g por unidad de semilla monogérmica	Mezclar en proceso de peletización de semillas. Máximo una aplicación por temporada.
Trigo	Gorgojo argentino (<i>Listronotus bonariensis</i>)	100 g / 100 kg de semilla	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla: agregar 2 L de agua por cada 100 kg de semilla. Máximo una aplicación por temporada.
	(<i>Hylamorpha elegans</i>) Gusano blanco o Pololo verde del sur o San Juan verde (<i>Hylamorpha elegans</i>)	50 g / 100 kg de semilla	Mezclar en húmedo con adecuado cubrimiento de la semilla: agregar 2 L de agua por cada 100 kg de semilla. Máximo una aplicación por temporada.

PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: La dosis de **SALUZI®** puede aplicarse en seco o bien diluida en la cantidad de agua indicada en el cuadro anterior. En este caso se debe hacer la preparación en un recipiente adecuado, agitando hasta lograr una mezcla homogénea. Preparar sólo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para otro. El tratamiento se deberá realizar con equipos específicamente diseñados al efecto. En caso de no contar con ellos se deberá recurrir a un servicio externo de desinfección de semillas. **Las aplicaciones mediante el tradicional tambor rotativo, no son eficaces, por lo que no se recomienda este sistema.** En tratamiento húmedo, orear las semillas a la sombra y una vez secas sembrarlas.

INCOMPATIBILIDAD: no se han experimentado mezclas. En caso que se desee hacer un tratamiento mixto, por ejemplo con un fungicida, se deberá realizar previamente una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad ni disminución del poder germinativo, cuando es utilizado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO: dado que la aplicación se realiza a las semillas y estas van bajo la tierra, no corresponde establecer tiempo de reingreso para humanos ni animales.

PERIODO DE CARENIA: debido a la forma de aplicación, no corresponde establecer carencias.



CUIDADO

