

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Triadimefón pertenece al grupo químico de los Triazoles.

Precauciones de Uso:

Es venenoso, por lo que se debe evitar su ingestión y el contacto directo con la piel durante su aplicación. El producto debe ser manejado con precaución y quienes lo manipulen deben utilizar overol impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes impermeables. Durante la aplicación debe utilizar overol impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes impermeables. No se debe aplicar con viento. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto, ni permitir la entrada de animales domésticos o terceras personas al área de tratamiento. En general se deben cumplir estrictamente las instrucciones y prevenciones que se indican en la etiqueta del envase.

Síntomas de Intoxicación:

El producto es muy irritante para los ojos y ligeramente irritante para la piel. Prolongada exposición o excesiva inhalación puede producir irritación al tracto respiratorio.

Primeros Auxilios:

1) En caso de ingestión accidental NO inducir el vómito. Si la víctima está conciente, darle 1 o 2 vasos de agua y llamar a un médico inmediatamente. Si la víctima tiene convulsiones o esta inconsciente, acostarla de costado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, cuidando que las vías respiratorias estén libres. **Buscar ayuda médica.** **2) En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa inmediatamente y lavar abundantemente con agua de llave la zona afectada. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **Buscar ayuda médica.** **3) En caso de contacto con los ojos**, lavar abundantemente con agua los ojos abiertos por 15 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, mediante un procedimiento de lavar con abundante agua de la lave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos **Buscar ayuda médica.** **4) En caso de inhalación:** Procurar aire fresco al afectado. **Buscar ayuda médica.**

Antídotos: No tiene antídotos específicos.

Tratamiento Médico de emergencia: Realizar Tratamiento Sintomático.

Ecotoxicidad: No tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Teléfonos de Emergencia: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile: +5622633800

Precauciones de Almacenaje:

Manténgase bajo llave en el envase original etiquetado, bien cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor (entre 5 y 40 °C), fuera del alcance de los niños y animales, y lejos de alimentos, bebidas y piensos. No almacene con productos alimenticios, medicina, ropa o forraje. Manténgase alejado de los niños, animales domésticos o personas no autorizadas

Nota :

Se garantiza óptima calidad del producto y el porcentaje del ingrediente activo señalado en la etiqueta hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da garantía por consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del plaguicida es responsabilidad del usuario

TRIADIMEFON

25 WP

FUNGICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

TRIADIMEFON 25 WP, es un fungicida sistémico, que actúa por acción preventiva, curativa y erradicante, para el control de oidio, royas, septoriós, rinosporiosis y helmintosporiosis en los cultivos señalados en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

INGREDIENTE ACTIVO:

Triadimefón *25% p/p (250 g/kg)
Cofomulantes, c.s.p.100% p/p (1 kg)

* 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ona.

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2328

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

LOTE N° :

CONTENIDO NETO:

FABRICANTE:
PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town,
Feng-Xian District, Shanghai, P.R. of CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Pilarquim Chile SA
Dr. SOTERO DEL RIO 508, OF 723,
EDIFICIO CONGRESO, SANTIAGO DE CHILE

INSTRUCCIONES DE USO

TRIADIMEFON 25 WP, fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol, que es un componente esencial de la membrana celular de los hongos, combatiendo oidio, roya, septoriosis, rinosporiosis, helmintosporiosis en los cultivos indicados en la siguiente tabla de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Avena, Trigo Cebada	Oídios, Royas, Septoriosis, Rinosporiosis Helmintosporiosis	250 - 500 g/ha	Efectuar la primera aplicación al aparecer los primeros síntomas y la segunda 15 días después. Como curativo y erradicante usar dosis mayores (Dos aplicaciones por temporada).
Parronales viñas	Oidio de la vid	250-500g/ha	Efectuar 3 aplicaciones en plena flor, flor o cuaja vía líquida.
Manzanos	Oidio del manzano	350 - 450 g/ha 20 -30 g/100 lts de agua.	Aplicar una o 2 veces en forma preventiva a fines de caída de pétalos e inicio de cuaja.
Duraznero, Nectarino, Damasco	Oidio	20-25 g/100 lts. de agua	Aplicar dos veces en la temporada, en plena flor y caída de pétalos. Usar un mojarriente de 1.500 L/ha.
Sandía, Melón, Pepino, Zapallo	Oidio	300 - 500 g/ha 25 -30 g/100 lts. de agua.	Aplicar al aparecer los primeros síntomas. Efectuar una segunda aplicación 15 días después, si es necesario, de acuerdo con las condiciones del clima (Máximo 2 aplicaciones por temporada).
Remolacha	Oidio	500 g/ha	Aplicar al aparecer los primeros síntomas. Repetir si es necesario totalizando 2 aplicaciones por temporada
Lentejas y Porotos	Oidio	500 g/ha	Aplicar una vez, cuando se observen los primeros síntomas.
Tomate	Oidio y Royas	300 -500 g/ha 25 - 30 g/100 lts. de agua.	Aplicar al aparecer los primeros síntomas efectuando hasta 2 aplicaciones, dependiendo las condiciones de la temporada.
Ornamentales (crisantemo, rosa, clavel)	Oidio y Royas	300-500 g/ha 25-30 g/100 lts. de agua.	Aplicar cuando se manifiesten los primeros síntomas. Repetir una segunda vez si es necesario (Máximo 2 aplicaciones por temporada).
Viveros Forestales	Oidio	300-500 g/ha 25-30 g/100 lts. de agua	Aplicar al aparecer los primeros síntomas. Repetir una segunda aplicación, sólo si es necesario (Máximo 2 aplicaciones por temporada).

Método adecuado para preparar la solución: Pesar la cantidad exacta de **TRIADIMEFON 25 WP**. Vaciar en un envase con una pequeña cantidad de agua y revolver hasta lograr una solución homogénea. Incorporar al estanque del equipo, el cual debe estar a media capacidad de agua. Mantener la agitación durante la aplicación.

Incompatibilidad: Triadimefón 25 WP es incompatible con productos Ácidos y Óxidos fuertes. En caso de duda, efectuar prueba de compatibilidad.

Compatibilidad: En Viñas y Parronales puede aplicar en forma preventiva alternándolo con fungicidas de diferentes modos de acción. Las aplicaciones pueden ser vía líquida o mezclado con azufre vía polvo.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

Periodo de Carencia (días):

Cultivo	días	Cultivo	días	Cultivo	días
Cereales	28	Manzanos	14	Remolacha	3
Parronales y viñas	14	Cucurbitáceas	3	Leguminosas	7
Tomate	3	Carozos	28	Ornamentales	N.C.*
Viveros Forestales	N.C.				

*N.C. No corresponde

Tiempo de Reingreso: Se puede entrar después de 12 horas de la aplicación, para personas y animales.

