

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TRICHO-D WP es un fungicida biológico con esporas en latencia del hongo *Trichoderma harzianum* con cepa referencia ATCC 20847-T22

PARA SU SEGURIDAD DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar la aspersión del polvo o de la aspersión. No ingerir, No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Durante la manipulación, usar antiparras, mascarara con filtro, guantes impermeables. Durante la aplicación usar botas impermeables, guantes impermeables, antiparras y mascarara con filtro. No permitir el ingreso de personas extrañas al área de aplicación. No aplicar con viento superior 5 Km/hr.

PARA SU SEGURIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: Después de la jornada de trabajo cambiar la ropa y lavarse antes de comer, beber o fumar. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA: No presenta ecotoxicidad, ya que está omnipresente en la naturaleza y se encuentra comúnmente en suelo, agua y aire. No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales, ni abejas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión, posible diarrea. En caso de contacto con la piel u ojos, posible irritación.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si persiste una irritación consultar al medico.

En caso de uso de lentes de contacto, lavar con abundante agua durante 5 minutos, retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta del producto.

INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco, si se presenta alguna molestia, consultar al médico y mostrarle la etiqueta del producto.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Sintomático y de sostén.

ANTÍDOTO: No posee antídoto específico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SE REALIZA DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Después de usar el producto se debe realizar el triple lavado del envase, adicionando agua, se agita, se retira el agua y se repite esta acción por tres veces consecutivas. Después se inutilizan los envases y se eliminan de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. Los envase y equipos de aplicación no se deben lavar en ríos, lagos y otras fuentes de agua. En caso de intoxicación mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud. No ingresar al área tratada antes del periodo indicado de reingreso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:(56) 2 24431040 - SANATRADE S.A. 9-8769957

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO, ETIQUETADO, EN UN LUGAR FRESCO, SECO, BAJO LLAVE A TEMPERATURA MINIMA DE 5°C Y MAXIMA DE 50°C. SE DEBE ALMACENAR EN BODEGA QUE CUMPLA CON NORMATIVA "ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS". DURACIÓN DEL PRODUCTO EN ENVASE SELLADO. 2 AÑOS.

Tricho D

POLVO MOJABLE (WP) - FUNGICIDA BIOLÓGICO

TRICHO-D WP es un Fungicida biológico para el control de hongos en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Trichoderma harzianum cepa ATCC 20847-T22*

Coformulantes c.s.p.c.

Contiene un mínimo de 1 x 10⁸ esporas/g

20 % p/p (200g/Kg)

100% p/p (1 kg)

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N° 2594
LEA DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LOTE N°

FORMULACIÓN:

VENCIMIENTO:

FABRICADO POR:



www.oriusbiotech.com

orius@orius.com.co

Calle 15 No. 37 J-04, Esperanza 8a.
Villavicencio, Colombia.
Teléfono: +57 8 6700472

IMPORTADO POR

SANAGRO
DIVISIÓN AGRÍCOLA
DE SANATRADE S.A.

Santa Clara No. 301, oficina
2803, Huechuraba, Santiago
Teléfono: +56 2 24431040
email: ventas@sanagro.cl

CONTENIDO
NETO
300 g

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD - FITOPATOGENAS	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
VID (<i>Vitis vinifera</i>)	Pudrición Gris (<i>Botrytis cinérea</i>)	300 g/ha	Aplicación en aspersión foliar desde la floración. Repetir cada 25 días. Máximo 5 aplicaciones por temporada dependiendo de la canopia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue agua al envase, taparlo, agitarlo y después vierta el contenido en la bomba y complete con la cantidad de agua necesaria. La mezcla debe mantenerse en agitación y aplicarse hasta 8 horas después de la preparación. Si se aplica con otros agroquímicos compatibles, se agrega al final en el orden de la mezcla.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con fungicidas químicos, pero puede ser usado alternadamente para lograr efecto de choque. Dejar transcurrir 48 horas desde la aplicación química y aplicar TRICHO-D® WP al huerto para así permanecer protegido por más tiempo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico, ya que por su composición biológica entra en simbiosis con las plantas, estimulando a la planta el desarrollo de masa radicular.

PERÍODO DE CARENCIA: La carencia del producto es de cero días. Se aplica sobre el suelo y no es absorbido por el cultivo.

TIEMPO DE REINGRESO: Periodo de reingreso al campo aplicado es de 2 horas para personas u/o animales.

NOTA AL COMPRADOR: El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos derivados de su mala aplicación y almacenaje inadecuado.

**UTILICE LA DOSIS SEGÚN LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA
CONSULTE CON UN ASISTENTE TÉCNICO**



CUIDADO

