



We create chemistry

Ventur[®]

Fungicida Suspensión Concentrada (SC)

Fungicida formulado a base de dos materias activas, epoxiconazol y boscalid, con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades y en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

Epoxiconazol*	6,7% p/v (67 g/L)
Boscalid**	23,3% p/v (233 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/v (1 L)

* (2*RS*, 3*SR*)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1*H*-1,2,4-triazol

** 2-cloro-*N*-(4'-clorobifenil-2-il)-nicotinamida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2651

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: 5 Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

BASF Española

Ctra Nacional 340 Km 1156,
43006 Tarragona, España

Importado y Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: (56) 2 2640 7000

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E

© Marca Registrada BASF



CUIDADO



Ventur®



ABRA AQUÍ - Instrucciones de Uso al Reverso

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Epoxiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles y Boscalid pertenece al grupo químico de las piridincarboximidaz.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial.
- Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable y protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separada de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** lavar los ojos con abundante agua de la llave limpia por 15 o 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirar los lentes y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Dejarlo en reposo. Si no respira proporcionar respiración artificial. Llamar al médico.
- **Ingestión:** no inducir el vómito a menos que sea bajo supervisión médica. Nunca dar nada por la boca si el afectado está inconsciente. Acudir al médico o Centro Asistencial inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Ventur® en condiciones normales de uso, es no tóxico para abejas y aves. Es tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"SE SÓSPECA QUE DAÑA AL FETO". "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800

CITUC Químico (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12/2016.-M.E.S DIC 2016-7



CUIDADO



Ventur[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Ventur[®], fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades y en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES TERRESTRES Y/O AEREAS

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo (blanco y candeal)	Mancha ocular (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), Septoriosis (<i>Septoria tritici</i>), Royas o polvillos (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>P. recóndita</i> , <i>P. graminis</i>), Oídio (<i>Blumeria graminis</i>)	1,5 L/ha	Aplicar Ventur[®] , de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30° C). En aplicaciones terrestres aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 100 - 200 L de agua/ ha.
Avena, Cebada	Royas o polvillos (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>P. recóndita</i> , <i>P. graminis</i>), Oídio (<i>Blumeria graminis</i>), Helmintosporiosis (<i>Drechslera teres</i>), Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha Aplicaciones por temporada: máximo dos.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Ventur[®]**. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

Incompatibilidades: No se han determinado incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidades: **Ventur[®]** es compatible con los productos fitosanitarios normalmente usados en cereales como: Perfekthion[®], Medax Top, Cycocel Extra[®]. Para favorecer la penetración y cubrimiento, **Ventur[®]** puede ser mezclada con el surfactante Break. Para mezclas en aplicaciones aéreas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: Evite la deriva de **Ventur[®]** sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de **Ventur[®]** no produce fitotoxicidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria, maíz y raps.

Períodos de Carencias: Respete carencia de 35 días en trigo, avena y cebada. En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso: 1 hora de espera es suficiente, previa verificación que el depósito aplicado se haya secado completamente. Reingreso para animales no aplica, ya que **Ventur[®]** no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

Nota: Con el uso repetido de **Ventur[®]** o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Ventur**, obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones (máximo 2), emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción, o alternarlo con otros fungicidas de diferente composición química o modo de acción, considerando que según clasificación FRAC, los ingrediente activos de **Ventur[®]**, epoxiconzol y boscalid pertenecen a los grupos G1 y C2, respectivamente.

© = Marcas registradas BASF



CUIDADO

