



Santiago, 30 de marzo de 2021

SEÑOR
RODRIGO ASTETE ROCHA
INGENIERO AGRÓNOMO
JEFE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At. Señora Alejandra Aburto, Jefa Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas
Pablo Reyes Muñoz - Jefe del Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida **ORTHENE® 75 SP, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.072**, para el Control Obligatorio de Chinche pintada (*Bagrada hilaris*)

ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A. declara que es posible recomendar el uso del insecticida **ORTHENE® 75 SP, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.072**, para el control de *Bagrada hilaris*, el cual es efectivo en Lechuga, Acelga, Espinaca y Hortalizas de hoja (incluye Brassiaceae de hoja) Rúcula, Kale, Pak-choi, Pak tsai, Pak-tsoi, Mizuna, Mostaza verde, Mostaza india, Raps, Alhelí).


ORTHENE® 75 SP para el control de *Bagrada hilaris* puede ser aplicado, 3 veces durante la temporada, desde la aparición de los primeros individuos en dosis de 1 kg/ha con un volumen de agua de 100 - 500 L/ha, con un período de protección de 7-10 días.

Acefato tiene tolerancia en Lechuga, Acelga, Espinaca y Hortalizas de hoja (incluye Brassiaceae de hoja) Rúcula, Kale, Pak-choi, Pak tsai, Pak-tsoi, Mizuna, Mostaza verde, Mostaza india, Raps, Alhelí) en Chile según se indica en el cuadro siguiente:

La recomendación se resume en el siguiente cuadro:

Cultivo	Dosis (Kg/ha)	N° Máximo de aplicaciones por temporada	Periodo de Protección (días)	Tiempo de Reingreso (horas)	Carencia nacional (días)	Momento de aplicación	% de eficacia
Lechuga, Acelga, Espinaca	1	3	7 - 10	24	31	Según monitoreo, al aparecer los primeros individuos adultos. En cultivos de transplante (plantines de 4 hojas verdaderas). En hortalizas de siembra directa una vez emergidas las plantas según presión de la plaga.	100% de eficacia después de 72 horas de la aplicación.
Hortalizas de hoja (incluye Brassiaceae de hoja) Rúcula, Kale, Pak-choi, Pak tsai, Pak-tsoi, Mizuna, Mostaza verde, Mostaza india, Raps, Alhelí).					15		

Acefato ingrediente activo de **ORTHENE® 75 SP** pertenece al grupo IRAC 1B.



Verónica Bravo D.
Sub Gerente Asuntos Regulatorio
Arysta LifeScience Chile S.A.
Adj. lo ind.

* En caso de indicar dosis en cc o gr / ha, especificar mojamamiento. Si se indica rango, se debe especificar que mojamamiento corresponde para cada uno de los valores del intervalo. Adicionalmente, se debe indicar cuando se usa la dosis menor y cuando la mayor.

